


[H] Chinese

Vol. V

5

v. 11 - v. 13



尚德按今有方九首

尚德按今有方五首

尚德按今有方五首

尚德按今有方五首

尚德按今有菜等二

十六件
尚德按附
字下是免

字下疑脫
之字

唐王壽先生外臺祕要方卷十一目錄消渴消中十八門

消渴方一十七首

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

消渴口乾燥方三首

睡中尿牀不自覺方六首

濕後思成水病方三首

強中生諸病方六首

卒泄瀉小便多太數方八首

米息禁忌論一首

餘茅等三十二仙

近效極要消渴方二首

濕和虛經脈澀成癰膿方一十一首

淮中淮濕賢淮方八首

濕後小便多恐生諸瘡方二首

虛勞小便白濁如脂方四首

泔泔不宜鍼灸方一十首

近郊社音盡前中汧渭方二首

余息以等一五仁

命之

鄧州縣志

唐王燾先生外臺祕要方卷十一

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 衍 道 敬 通 父 訂 梓

消渴方一十七首

通按使音
茂禪二音
安也靜也
宋本五作
止止作為

病源夫消渴者渴而不小便是由少服五石諸丸散積久經年石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年
衰血氣減少不能制于石石勢獨盛則腎為之燥故引水而不小便也其病變者多發癰疽此坐熱氣留
於經絡經絡不利血氣壅滯故成癰膿也診其脈數大者生細小浮者死又沈小者生實牢大者死有病
口甘者名為何何以得之此五氣之溢也名曰脾瘴夫五味入於口藏於胃脾為之行其精氣溢在於脾
令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥肥令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢為消渴
也厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱肌不欲食甚者則欲吐下之不肯止養生法云人睡卧勿張口久
成消渴及失血也赤松子云卧閉目不息十二通治飲食不消其湯熨鍼石別有正方補養宣導令附於
後法云解衣使卧伸腰腹少腹五息止引腎去消渴利陰陽解衣者使無壅礙使卧者無外想使氣易行
伸腰者使腎無逼臆腹者大努使氣滿少腹者攝腹牽氣使五息即止之引腎者引水來咽喉潤上部去
消渴枯槁病利陰陽者饒氣力也出第五卷通按後條古人喜石宜消渴今服石者少何有此症緣酒
多令中三焦熱臍膈燥亦致消渴不必皆由服石也但治法頗同
千金論曰夫消渴者凡積久飲酒無有不成消渴病者然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以
加脯炙鹽鹹此味酒客多嗜不離其口三觴之後制不由己飲噉無度咀嚼鮮醬不擇酸鹹積年長夜酣
興不懈遂使三焦猛熱五藏乾燥木石猶且焦枯在人何能不渴療之愈否屬在病者若能如方節慎旬
月而瘳不自愛惜死不旋踵方書醫藥實多有效其如不慎者何其所慎者有三一飲酒二房室三鹹食
及麪能慎此者雖不服藥而自可無他不如此者縱有金丹亦不可救深思慎之深思慎之凡消渴之人
愈與未愈常須慮患大癰何者消渴之人必於大骨節間忽發癰疽而卒所以戒在大癰也當預備癰藥

通按近效 渴後飲 嘔逆成 忍成難 水病亦 此方 尚德按 金無地 皮用枸 子十分 又按得 下子金 尚德按 金生麥 尚德按 冬汁二 尚德按 金按神 二兩 尚德按 三兩 金按及 金作入 尚德按 金分門 金分

以防之宜服麥門冬丸除腸胃熱實兼消渴方 麥門冬去心茯苓去青黃連 石膏碎姜糖各八人參

龍膽 黃芩各六分升麻四分栝蒌一分枳實五分生薑屑十分地骨皮六分茅根切一粟米三右十五味以水

六升煮茅根及粟米令爛餘十三味搗末蜜和丸如梧子以前茅根粟米汁作飲服十九日二若渴則

與此飲至足大麻亦得忌猪肉酢物

又栝蒌湯方 栝蒌五兩麥門冬汁三生薑五兩茅根切三蘆根切二右五味以水一斗煮取三升分

為三服忌如藥法

又胃腑實熱引飲渴後苓湯洩熱止渴方 茯苓一作茯神一作神栝蒌各五知母兩四小麥二麥門冬五兩大棗十二

枚去生地黃六兩姜糖四兩淡竹葉三右九味切以水三斗先煮小麥竹葉取九升去滓內諸藥煮取四

升分四服不問早晚隨渴即進非但正治胃渴通治渴病熱即服之忌蕪荑酢物

又猪肚丸療消渴方 猪肚一枚治黃連五兩栝蒌 麥門冬去心知母 茯苓各四梁米五右七味搗

為散內肚中線縫安置甑中蒸之極爛熟接熱及藥木臼中搗可堪丸若硬加少蜜和丸如梧子飲汁

下三十九日再服漸加至四五十丸渴即服之同

又栝蒌散方 栝蒌八分麥門冬去心甘草六分鉛丹八分右四味搗為散以漿水服方寸匕日三服忌海藻

松菜各六分又按及于

又黃耆湯方 黃耆 茯苓 栝蒌 甘草炙麥門冬去心各五乾地黄五右六味切以水八升煮取二

升半分三服忌蕪荑酢物海藻松菜日進一劑服十劑訖服丸藥後腎消門中宣補丸是

又方 取七家井索近桶口結處燒作灰 右一味以井華水服之不過三服

又方 飲鼓汁任性多少差止

又方 濃煮竹根汁飲之取差止附後

又方 煮青梁米汁飲之差止附後

尚德按千金石韋人各四兩附子三兩無遠志有從容四兩石斛作石膏白蜜二升作三升

又消渴陰脈絕胃反吐食方 茯苓八兩澤瀉四兩 白朮 生薑 桂心各三兩 甘草炙一兩 右六味切以水一

斗煮小麥三升取五升去滓內茯苓等煮取二升半一服八合日再同

又方 取屋上瓦三十年者破如雀頭三大升以東流水兩石煮取二斗 乾地黄 生薑各八兩 橘皮

甘草炙人參黃耆各三兩 桂心二兩 遠志三兩 當歸 芍藥各二兩 大棗二十枚 白朮八兩 右十二味切內瓦

汁中煮取三升分溫四服單瓦汁亦佳甘草一方無

又療熱病後虛熱渴四肢煩疼方 葛根一斤 人參 甘草炙各一兩 竹葉一把 右四味切以水一斗五升煮取

五升渴則飲一升日三夜二忌海藻松菜

又虛熱渴無不效填骨煎方 茯苓 兔絲子 山茱萸 當歸各三兩 大豆黃卷升 石韋二兩 牛膝 巴

戟天 麥門冬去心各三兩 天門冬去心各五兩 五味子三兩 人參二兩 遠志三兩 桂心 附子炮各三兩 石斛三兩 右十六

味先搗篩別取生地黃十斤生栝蓂十斤春絞取汁於火上煎之減半便作數分內藥并下白蜜二升

牛髓一升微火煎之令如糜食如雞子黃大日三亦可飲服之佳忌酢物鯉魚生葱猪肉冷水一方有肉從容

又方 桃膠如彈丸含之咽津甚佳本方療渴小便便利復非淋

又方 蠟如雞子大酢一升煮兩沸適寒溫頓服之本方療渴小便便利復非淋而且長不吐淋虛之滴漉也故曰復非淋

又方 水和栝蓂散服方寸匕亦可蜜丸如梧子服三十九日再服無所忌並出第二十一卷中

近效極要消渴方三首

近效極要論消渴舊來以為難療古方有黃連湯牛膽丸為勝亦不能好差自作此方以來服者皆差服

多者即吐水豈有更渴之理

又療消渴麥門冬丸方 麥門冬五兩 去心乾地黄三兩 蜀升麻 黃芩各五兩 栝蓂七兩 苦參八兩 人參三兩 黃連 黃

柏各五兩 右九味末之以牛乳和眾手捻作丸子暴乾以飲服二十九日二加至五六十丸忌蕪荑猪

近效極要消渴方三首 近效極要無中小便多漸瘦方四首

黃連上宋
本有宣州
二字

地骨皮家
本作生枸
杞根

尚德按服
服千金作
飲服千金
又按丸房
千金作丸
房方字上
本有秘字

肉冷水

又方 黃連^{五兩}苦參^{一斤}知母^{五兩}栝蓰^{二兩}麥門冬^{去心}牡蠣粉^煮人參 黃耆 乾地黄^{各五兩} 右九味末之
以牛乳丸清漿服二十丸日二服加至五十丸忌猪肉冷水蘆薈

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

近效極要論熱中雖能食多小便多漸消瘦方 地骨皮^{升切}一麥門冬^{三兩}黃連^{二兩}小麥^{八兩}人參^兩 右

五味切以水九升煮取三升八合去滓分為三服間食服之如不能多服分作四五服亦得忌猪肉

又方 人參^{五兩}麥門冬^{去心}牡蠣粉^{各八兩}乾地黄^{升切}知母^{各八兩}苦參^{八兩}黃連 栝蓰^{各八兩} 右八味末之以

生牛乳為丸如梧子清漿服十五丸日再加至四十丸食後服忌蘆薈猪肉冷水

又療小便多或不禁方 兔絲子^{二兩}蒲黃 黃連 硝石^{各三兩}肉苁蓉^{二兩} 右五味兼雞腔脰中黃皮三

兩為散服服方寸匕日三服如行五里久又一服末有不差者忌猪肉^{千金名}

又療小便數多不足日便一二斗或如血色方 麥門冬^{八兩}茯苓^{三兩}甘草^{一兩}乾薑^{四兩}桂心^{二兩}乾

地黄^{八兩}續斷^{二兩} 右七味切以水一斗煮取二升五合分為三服忌海藻松菜生葱蘆薈^{古今錄驗} 腎消脚瘦細

似血虛冷者

渴利虛經脈瀼成癰腫方十一首

病源夫渴利者隨飲小便是也由少服乳石石熱感時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥腎

燥則渴然腎虛又不能傳制水液故隨飲小便也其病變多發癰疽以其內熱而小便利故也小便利則

津液竭津液竭則經絡澀經絡澀則榮衛不行榮衛不行則熱氣留滯故成癰腫也^{此第五}

千金療下焦虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方 小麥^升竹葉^{三升}麥門冬^{去心}茯苓^{各四兩}甘草^{三兩}大棗^十

枚^去生薑 栝蓰^{各五兩}地骨皮^升 右九味切先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八升去上沫

取七升煮藥取三升分三服忌海藻松菜酢物

翼同分兩小別
出第十卷中

消渴口乾燥方三首

廣濟療口乾數飲水腰脚弱膝冷小便數用心力即煩悶健忘方 麥門冬去心十二分 牛膝六分 龍骨 土瓜

根各八狗脊 茯神 人參各六分 黃連六分 牡蠣六分 山茱萸八分 兔絲子十二分 酒麋茸八分 右十二

味搗篩為末蜜和丸每服食後煮麥飲服如梧子二十九日二服漸加至三十九忌生菜麴猪牛肉蒜

粘食陳臭酢物等

又療消渴口苦舌乾方 麥門冬五兩 茅根一兩 栝婁三兩 烏梅十顆 小麥二升 鋤切一升 右六味以水九

升煮取三升去滓細細含咽分為四五服忌麴炙肉並出第

千金口含酸棗丸療口乾方 酸棗一升 石榴子五合 葛根三兩 烏梅五十顆 麥門冬四兩 茯苓三兩 覆

盤子三兩 桂心三兩 石蜜四兩 栝婁三兩 右十味搗篩蜜和為丸含如酸棗許大不限晝夜常令口中

有津液出為佳忌大酢生葱翼同出第

消中消渴腎消方八首

病源內消病者不渴而小便多是也由少服五石熱結於腎內熱之所作也所以服石之人小便利者石

性歸腎腎得石則實實則消水漿故利利多則不得潤養五臟藏衰則生諸病焉由腎盛之時不惜真氣

恣意快情數使虛耗石熱孤盛則作消中故不渴而小便多也出第

千金論曰夫內消之為病當由熱中所作也小便多於所飲令人虛極短氣又內消者食物皆消作小便

而又不渴正觀十年梓州刺史李文博先服白石英久忽然房道強盛經月餘漸患渴經數日小便大利

日夜百行以來百方療之漸以增劇四體羸瘦不能起止精神惓惓口舌焦乾而卒此病雖稀甚可畏也

利時脈沉細微弱服栝湯即效若恐不能長愈服鉛丹散立效其間將服除熱宣補丸栝湯方 栝

枝葉一斤 栝蔓根 石膏 黃連各三兩 甘草二兩 右五味切以水一斗煮取三升去滓分溫五服日

忘字上宋
本有不利
二字

尚德按干
金烏梅十
枚桂心一
兩六錢
又按盤干
金作盆
尚德按今
有方九首

尚德按德
恍十金作
恍德
尚德按干
金甘草三

兩

尚德按干
金八味各
五分

尚德按干
金龜線子
三合從蓉
六兩半根
湯作節根
有二字下
字
尚德按干
金茯苓黃
苓各二兩

尚德按干
金阿膠二
挺
又按千金
無人參甘
草止五味
尚德按干

三夜二服困重者多合渴即飲之忌海藻松菜猪肉

又鉛丹散主消渴止小便數兼消中悉主之方

石膏研白石脂入研赤石脂各五右八味搗研為散水服方寸匕日三服少壯人一匕半患一年者服

之一日差二年者二日差渴甚者夜二服若腹中痛者減之丸服亦佳服十丸以差為度不要傷多

令人腹痛此方用之如神已用經今三十餘載矣忌海藻松菜文仲云腹中痛者宜漿水飲汁下之亦

得又備急云不宜酒下用麥汁下之亦得丸服者服十九日再服合一劑救數人得愈古今錄驗云服

此藥了經三兩日宜爛煮羊肝肚空腹喫之或作羹亦得宜湯淡食之候小便得鹹苦即宜服後從從

荅丸兼煮散將息

又療腎消渴小便數宣補丸方黃耆 栝萸 麥門冬 茯苓 人參 甘草 黃連 知母 各三

地黃石膏 研各免絲兩三肉從蓉兩右十二味末之以牛膽汁三合共蜜和丸梧子大以茅根汁服

三十九日漸加至五十九一名茯苓丸同集驗

又療腎氣不足虛損消渴小便數腰痛宜服腎瀝湯方羊腎一具 去脂遠志 人參 澤瀉 乾地黃

桂心 當歸 龍骨 甘草炙麥門冬去心五味子合從苓 兩芍藥兩黃芩兩生薑兩大棗二十

右十六味切以水一斗五升煮羊腎取一斗二升內藥取三升分三服忌海藻松菜生葱酢物無美難

又阿膠湯療久虛熱小便利而多或服石散人虛熱多由汗出當風取冷患脚氣喜發動兼消渴腎消服

細弱服此即立減方阿膠 兩 乾薑 兩 麻子 升 遠志 四兩 附子 炮 人參 兩 甘草 三兩右七味切以水

七升煮取二升半去滓內膠令烱分三服說云小便利多白日夜數十行至一石令五日服之甚良忌

海藻松菜豬肉冷水

又腎消夜尿七八升方鹿角 一具 炙右一味搗篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

升壹必要 卷十一 消渴口乾燥方三首 四

金服五分
七日三漸
加至方寸

通接無脂
當作有脂

尚德按盤
疑當作金

蕪美

又黃耆湯主消中虛勞少氣小便數方 黃耆 芍藥 生薑 當歸 桂心 甘草各二大棗三十枚
門冬心法 乾地黄 黃芩各一兩 右十味切以水一斗煮取三升去滓空腹溫分三服忌海藻松菜生葱

古今錄驗論消渴病有三一渴而飲水多小便數無脂似飮片甜者皆是消渴病也二喫食多不甚渴小便少似有油而數者此是消中病也三渴飲水不能多但腿腫脚先瘦小陰痿弱數小便者此是腎消病也特忌房勞若消渴者倍黃連消中者倍栝蓢腎消者加芒硝六分服前件鉛丹丸得小便鹹苦如常後恐虛僞者並宜服此花旋蓉丸方 花旋蓉研 澤瀉 五味子 紫色戟天 地骨皮各四 磁石研水淘
乾之人參 赤石脂研 各五分 龍骨研 甘草炙 牡丹皮各五 乾地黄研 禹餘糧研 桑螵蛸三十
括蓢細 右十六味搗篩蜜和丸如梧子以牛乳空腹下二十九日再服忌海藻松菜胡荽蕪美等物
又服前丸渴多者不問食前後服煮散方 桑根白皮 薏苡仁各六 通草 紫蘇莖葉各四 五味子各
覆盤子 枸杞子各八 乾地黄研 茯苓 菴蓂各二 黃耆研 右十一味搗以馬尾羅篩之分為五貼
每貼用水一升八合煎取七合去滓溫服忌酢物蕪美出第二十卷中

睡中尿牀不自覺方六首

病源夫人有於眠睡中不覺尿出者是其稟質陰氣偏盛陽氣偏虛則膀胱腎氣俱冷不能溫制於水則小便多或不禁而遺尿膀胱足太陽也為腎之腑腎者足少陰也為藏與膀胱合俱主水凡人之陰陽日入陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則卧睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞為小便夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於睡眠而不覺尿牀也出第十卷中

肘後療少小睡中遺尿不自覺方 取鵲巢中麝燒水服一錢匕即差文仲方 千金同

又方 雄雞肝 桂心 右二味等分搗丸服如小豆一枚日三服

又方 雄雞屎白 桂心 右二味等分末酒服方寸匕日二亦可除桂心

又方 礬石燒令汁盡牡蠣熬 右二味等分末之以粟米粥飲服方寸匕日三

又方 雄雞喉嚨及矢白脰脰裏黃皮燒末麥粥清盡服之亦可以赤雞翅燒末酒服三指撮日三

又方 薔薇根隨多少剉搗以酒飲之並出第
二卷中

渴後小便多恐生諸瘡方二首

病源渴利之病隨飲小便也此謂服石之人房室過度腎氣虛耗故也下焦生熱則腎燥腎燥則渴然
腎虛又不能制水故小便利也其渴利雖差熱猶未盡發於皮膚皮膚先有風濕濕熱相搏所以生瘡也

出第五
卷中

近效恐腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便去皮膚瘡調中方 升麻四分玄參五分甘草四分知母五分

茯苓三分牡蠣六分漏蘆五分枳實六分葶藶四分黃連六分 右十味搗篩飲汁服方寸匕日再服以差為度忌

猪肉海藻松菜酢物

又方 栝蓰 茯苓各八分玄參四分枳實六分 苦參 甘草炙 橘皮各三分

方寸匕日再服忌海藻大酢松菜 右七味搗篩每空腹以漿水服

渴後恐成水病方三首

病源五藏六腑皆有津液若腑藏因虛實而生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩
背寒而嘔者因利虛故也診其脈心脈滑甚為善渴其久病變或發癰疽或為水病出第五
卷中

近效渴後數飲嘔逆虛羸恐成癰疽水病方 茯苓五分栝蓰六分升麻四分麥門冬六分桑根白皮八分橘皮三分

右六味搗為散清水服一方寸匕日再服忌酢物

又方 人參 猪苓各三分通草五分黃連六分麥門冬心去栝蓰各八分 右六味搗為散漿水送方寸匕日再服

以差為度忌猪肉冷水生冷等物

又若已覺津液竭身浮氣如水病者方 漢防己 猪苓各六分栝蓰八分茯苓四分桑根白皮十二分白朮三分杏

虛勞小便白濁如脂方兩首

宋本無此
以下二字

仁去皮郁李仁各六分葶藶子十二分右九味搗篩蜜和丸如梧子空腹漿水服三十九日熱紫色一服腫消

小便快下為度忌酢物桃李雀肉等

又葶藶丸療消渴成水病浮腫方 甜葶藶煆紙桔萸仁 杏仁去皮共雙黃漢防己各一右四味為末

蜜丸搗二三百杵如梧子大服三十九食前茯苓煎湯送下日三四服

又瞿麥湯療消渴欲成水氣面目并足脰浮腫小便不利方 瞿麥穗 澤瀉 滑石各兩防己三分黃芩

大黃各一桑螵蛸炒十枚右七味切每服三錢匕水三升煮一升去滓空心溫服良久再服

尚德按今
有方五首

虛勞小便白濁如脂方四首 病源此由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而關竅在陰陰為尿便之道胞冷腎損故小便白而如脂或

枯萸五兩
宋本作五
大雨

如數片也出第四卷中崔氏飲水不知休小便中如脂舌乾渴方 黃連 桔萸各五右二味搗末以生地黃汁和丸併手丸

每食後牛乳下五十九日再服之忌猪肉 近效消渴肝肺熱焦枯消瘦或寒熱口乾日夜飲水小便如脂不止欲死方 水飛鐵粉三兩雞胞

脰五枚陰乾末入牡蠣研如粉黃連三右四味搗篩三五度鍊蜜和丸飲汁下如梧子大五十九重者不

過食時輕者手下差勿傳忌猪肉

又主消渴口乾方 黃連 豉暴令右二味一處搗令成丸食後飲服四十九日再丸稍大如常藥丸

常服有效忌猪肉

又消渴能飲水小便甜有如脂數片日夜六七十起方 冬瓜一枚黃連兩右截瓜頭去穰入黃連末火

中燉之候黃連熟布絞取汁一服一大盞日再服但服兩三枚瓜以差為度一方云以瓜汁和黃連末

和如梧子大以瓜汁空肚下三十九日再服不差增丸數忌猪肉冷水

經驗用大牡蠣不計多少以臘日端午日將黃泥裹煖通亦放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢

宋本黃連
上有取字
下有為末
二字或字
上有好字
暴字上有
微字
宋本黃連
上有蜀字
十兩下有
構為末三
字和字下

強中生諸病方六首

有九字
宋本無此
尚德按今
有方五首

病源夫強中病者莖長興盛不接精液自出是也由少服五石石熱住於腎中下焦虛熱少壯之時血氣尚豐能制於石及至年衰血氣減少腎虛不能制精液也若精液竭則諸病生矣出第五卷中

千金論曰夫人生放恣者最盛壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虛竭百病滋生又年少慮不能房多服石散真氣既盡石氣孤立唯有虛耗唇口乾焦精液自洩或小便赤黃大便乾實或渴而且利日夜一石以來或渴而不利或不渴而利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也又強中之病者莖長興盛不接精液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薺萸湯制腎中石熱又將服白鴨通丸便差

猪腎薺萸湯方

猪腎一具去脂

大豆

升薺萸三人參

茯神

磁石

知母

葛根

黃芩

栝萸

甘草

二兩各石膏碎

右十二味

切以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗以下去滓內諸藥煎取三

升去滓分溫三服渴乃飲之下焦熱者輒合一劑病勢漸歇即停忌海藻菰菜酢物

尚德按千
金人參三
兩碎字下
宋本並有
薺萸二字
尚德按無
字上千金
有夜字

尚德按仲
景無此論

尚德按子
金無大麥
二字卷飲
作小麥粥
飲

多而數也此皆是平人之候名曰腎渴但小便利而不飲水者名腎實也經曰腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人其於小便利者石性歸腎腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五臟藏衰則生諸病也張仲景曰若熱結中焦則為堅熱也熱結下焦則為溺血亦令人淋閉不通明知不必悉患小便利信矣內有熱氣者則喜渴也除其熱則止渴兼虛者須除熱而兼宜補虛則病愈

又療嶺南山瘴氣兼風熱毒氣入腎中變成寒熱脚弱虛滿而渴方

乳無即明牛乳及人乳亦得

右四味取三般汁乳和黃連末任多少眾手捻為丸如梧子大麥飲服三十丸漸加

至四十九五十九日三服輕者三日愈重者五日愈若藥苦難服即煮麥飲汁下亦得文仲云黃連丸

一名羊乳丸肘後同忌猪肉蘆薈

又療消渴浮萍丸方

浮萍

栝蔞根分等

右二味搗篩以人乳汁和為丸如梧子參飲服二十九日三

服三年病三日差

肝後文仲同
主虛熱甚佳

又療面黃咽中乾燥手足俱黃短氣脈如連珠除熱止渴利補養地黃丸方

生地黃汁

生栝蔞汁各

升生羊脂

三升牛脂亦得好蜜四升黃連末一斤

右五味搗合銀鍋中熬成煎可丸如梧子飲汁送五丸日三服

至十丸若苦冷而渴差即令別服溫藥忌豬肉蕪荑附後

又療渴小便數散方

知母六分栝蔞一斤使苓四分鉛丹一分雞肫腔中黃皮十四枚

右五味為散飲服方寸匕

日三禁酒生菜肉差後去鉛丹以蜜和之以麥飲長服勿絕良忌酢物附後

消渴不宜鍼灸方一十首

千金論曰凡消渴病經百日以上者不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水不歇遂成癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷皮肉若作鍼孔許大瘡者所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水出不止者必死慎之慎之初得消渴者可依後方灸刺之為佳孫氏云消渴病百日外既不許鍼刺所飲之水皆化為膿水不止者皆死特須慎之又云仍不得誤傷皮肉若有小瘡亦云致死既今亦得消渴且未免飲水水入瘡即損人今初得日豈得令其灸刺致此誤傷之禍輒將未順其理且取百日以上為能未悟初灸之說故不錄灸刺凡灸刺則外脫其氣消渴皆是宣疾灸刺特不相宜唯腳氣宜即灸之是以不敢灸者耳又有人患消渴小便多而數發在於春經一夏專服栝蔞及豉汁得其力渴漸差然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極差不減一升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦脣口乾燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩腳酸食乃兼倍於常而不為氣力者然此病皆由虛熱所為耳療法栝蔞汁可長服以除熱牛乳杏酪善於補此法最有益一卷中

文仲療消渴熱中加減六物丸方

栝蔞根八分麥門冬六分

知母五兩人參

苦參

土瓜根各四

右藥

搗篩以牛膽和為丸如小豆服二十九日三服麥粥汁下未知稍加至三十丸咽乾者加麥門冬舌乾

尚德按亦
字上千金
有食前後
無拘五字
宋本同但
拘作在誤

巳字下宋
本有不利
二字
作字下宋
本有不利
二字
宋本黃連
上有是字
日再作每
一升下宋
本有異者
二字

加知母腸下滿加人參小便難加苦參小便數加土瓜根隨患加之一分附後

又黃連丸主消渴方 黃連去心生地黄切右二味搗破地黃取汁漬黃連出暴之燥復內之令汁盡

乾搗之下篩蜜和丸如梧子服二十丸日三服亦可散以酒服方寸匕日三服盡更令作即差止忌猪

肉蕪美附後集卷十金廣濟
同並出第八卷中

千金栝蒌粉散療消渴秘方 添搗大栝蒌根厚削皮至白處 右一味寸切以水浸一日一易經五日

出取爛搗破之以絹袋盛攪之一如出粉法水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少

取差止出第二十
一卷中

肘後主消渴方 秋麻子一升以水三升煮三四沸取汁飲之無限不過五升差文仲同出
第二卷中

廣濟療消渴兼氣散方 栝蒌 石膏研甘草各三兩 右四味搗篩為散食後煮大麥飲服方寸

匕日二夜一服漸加至二匕忌麪海藻菰菜

又療消渴麥門冬湯方 蘆根 芒根各切石膏六分 生薑 栝蒌各五兩 小麥 生麥門冬去心各 右

七味切以水二升煮取六升去滓一服一升渴即任意飲未差更作出第一
卷中

崔氏療患熱消渴常服有驗方 豉心以酸醋拌蒸乾如黃連各三兩 右二味搗篩訖以蜜和為丸日再

空腹服二十五丸食後又服二十丸又取烏梅十顆以水二小升煎之數沸取湯下前件丸藥如無烏

梅以小麥子二升煮取汁亦得

又方 黃連一升麥門冬五兩
去心 右二味搗篩以生地黄汁栝蒌根汁牛乳各三合和頓為丸如梧子一

服二十五丸飲下日再服漸漸加至三十丸若不頓為丸經宿即不相着也消渴及小便多並是虛熱

但冷將息即差前件三方崔氏本方中此處更有一方用
栝蒌黃連者故云前件三方 並是冷補空腹服恐少腹下冷常喫少許食

服之大好忌猪肉蕪美

又療消渴無此方 土瓜根八兩 苦參粉三兩 黃連五兩 鹿茸炙 栝蒌各三兩 雄雞腸三兩 牡蠣五兩 白石脂研 甘

尚德按酒
千金作消
宋本同
又按此方
又見第三
分兩不同
尚德按千
金云不知
九取至七
云一月而
云九下末
本有食上
飲下四字
尚德按取
性飲者
謂隨酒量
飲之也

草黃耆各三桑螵蛸三七白龍骨五兩雞肫腔黃皮三十右一十三味搗篩為散一服六方寸匕

日再服夜一服以後藥下之

竹根十麥門冬石膏各四兩甘草根白皮三兩右四味切以水一斗二升煮取三升五合以下前件散

藥如難服可取此藥汁和丸一服六十九丸仍還用此藥汁下之忌猪肉海藻松菜出第四卷中

千金加減巴郡太守奏三黃丸療男子五勞七傷酒渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方

春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩

秋三月黃芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩

右三味隨時合搗下篩以蜜和為丸如大豆服五九日三不知稍增七丸服一月病愈久服走及奔馬

近常試驗忌猪肉一卷中

卒消渴小便多太數方八首

肘後卒消渴小便多方多作竹瀝飲之悉口數日差忌雞炙肉飲竹瀝非恣食也

又方酒煎黃柏汁取性飲之通按性飲者若人飲性畏冷即少飲也

又方熬胡麻令變色研淘取汁飲半合日可三四服不過五升即差

又療日飲水一斛者方桑根白皮新掘入地三尺者佳炙令黃黑色切以水煮之無多少但令濃隨意

飲之無多少亦可內少粟米勿與鹽集驗云宜煎飲之

又小便卒太數復非淋一日數十過令人瘦方末中水猪脂如雞子一枚炙承取肥汁盡服之不過三

劑差

又方羊肺一具作羹內少肉和鹽豉如食法任意進之不過三具差同千金

又方豉一升內於鹽中綿裹之以白礬好者半斤置綿上令熬之三斗末許時即下白礬得消入豉中

出暴乾搗末服方寸匕

又小便數猪肚黃連丸方 猪肚一枚洗黃連末三斤内猪肚中蒸之一石米熟即出之暴乾搗丸如梧子服三十丸日再服漸漸加之以差為度忌猪肉出第二卷中

近效祠部李郎中消渴方二首

論曰消渴者原其發動此則腎虛所致每發即小便至甜醫者多不知其疾所以古方論亦闕而不言今略陳其要按洪範稼穡作甘以物理推之淋錫醋酒作脯法須臾即皆能甜也足明人食之後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸精氣氣則下入骨髓其次以為脂膏其次為血肉也其餘別為小便故小便色黃血之餘也駭氣者五藏之氣鹹潤者則下味也腰腎既虛冷則不能蒸於上穀氣則盡下為小便者也故甘味不變其色清冷則肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上洩皆為乳汁消渴疾者下洩為小便此皆精氣不實於內則便羸瘦也又肺為五藏之華蓋若下有暖氣蒸即肺潤若下冷極即陽氣不能昇故肺乾則熱故周易有否卦乾上坤下陽阻陰而不降陰無陽而不昇上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之其釜若以板蓋之則煖氣上騰故板能潤也若無火力水氣則不上此板終不可得潤也火力者則為腰腎強盛也常須煖將息其水氣即為食氣食氣若得暖氣即潤上而易消下亦免乾渴也是故張仲景云宜服此八味腎氣丸並不食冷物及飲冷水今亦不復渴比頻得效故錄正方於後耳凡此疾與脚氣雖同為腎虛所致其脚氣始發於二三月或於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月或於十一月十二月衰於二月三月其故何也夫脚氣者擁疾也消渴者宣疾也春夏陽氣上故擁疾發即宣疾愈也秋冬陽氣下故宣疾發即擁疾愈也審此二者疾可理也又宜食者每間五六日空腹一食餅以精羊肉及黃雌雞為臠此可溫也若取下氣不食肉菜食者宜煮牛膝韭蔓菁又宜食雞子馬肉此物微擁亦可療宣疾也擁之過度便發脚氣猶如善為政者寬以濟猛猛以濟寬隨事制度使寬猛得所定之於心口不能言也又庸醫或令喫栝蓂粉往往往經服之都無一效又每至耄熟之時取爛美者水淘去浮者食之下候心胸間氣為度此亦甚佳生牛乳煖如人體渴即細細呷之亦佳張仲景云足太陽者是膀胱

尚德按足
太以下至
渴也仲景
無此論

尚德按要
略山茱萸
四兩澤瀉
三兩桂枝
附子各一
兩

宋本知母
十分分字
上有姜字
餘字下有
及數分三
字

當宋本作
當

宋本與才
不二字
宋本無舉
之傷也四
字

之經也膀胱者是腎之腑也而小便數此為氣虛氣虛則消穀大便硬則為消渴也男子消渴飲一斗水小便亦得一斗宜八味腎氣丸主之

神方消渴人宜常服之 乾地黄八兩薯蕷四兩茯苓三兩山茱萸五兩澤瀉四兩牡丹皮 附子炮桂心各三兩 右

藥搗篩蜜和丸如梧子大酒下十九丸少少加以知為度忌猪肉冷水魚羹胡荽酢物生葱汪小品深師古今錄驗

必效文仲
方等並同

先服八味腎氣丸訖後服此藥壓之方 黃連二十分苦參粉 乾地黄各十分知母牡蠣各八分麥門冬二十

分去 栝蒌無餘並同 右七味搗篩牛乳和為丸如梧子大併手作丸暴乾油袋或用漿水或牛乳下

日再服二十九丸一方服十五丸患重者渴差後更服一年以來此病特慎麋鹿肉須慎酒炙肉鹹物喫

索餅五日一頓細切精羊肉勿著脂飽食喫羊肉須著桑根白皮食一方云差後須服此丸一載以上

即永絕根源此病特忌房室熱麪并乾脯一切肉粳米飯李子等若覺熱渴加至二十五丸亦得定後還

依前減其方神效無比餘並準前方忌猪肉魚羹

將息禁忌論一首

夫人雖嘗服餌而不知養性之術亦難以長生養性之道不欲飽食便卧亦不宜終日久坐皆損壽也人欲小勞但莫久勞疲極也亦不可強所不能堪耳人不得每夜食食畢即須行步令稍暢而坐卧若食氣未消而傷風或醉卧當成積聚百疾或多霍亂令人暴吐又食欲得少而數不欲頓而多多即難消也能善養性者皆先候腹空積饑乃食先渴後飲不欲觸熱而飲飲酒傷多即速吐之為佳亦不可當風卧及得扇之皆令人病也才不遠而思之傷也悲哀憔悴傷也力所不勝而舉之傷也凡人冬不欲極溫夏不欲窮涼亦不欲露露星月下卧大寒大熱大風皆不用觸冒之五味入口不欲偏多偏多則損人腑臟故曰酸多即傷脾苦多即傷肺辛多即傷肝鹹多即傷心甘多即傷腎此是五行自然之理又傷初即不覺久乃損壽耳夫喫生肉鱸必須日午前即良二味中其鱸尤腥而冷也午後陰陽交錯人腹中亦順天時

偶宋本作
嘔

尚德按今
有菜等二
十六件

不成癥積亦能霍亂夫人至酉戌時後不要喫飯若冬月夜長性熱者須少食仍須溫軟喫訖須搖動令
食消散即不能成脚氣凡衝熱有汗不用洗手面及漱口令人五臟乾枯少津液又冬夏月不用枕冷物
石鐵尤損人木枕亦損人縱不損人及少年之時即眼暗也通按此條雖附消渴後不單言消渴也凡病
與不病人俱宜遵之從魚肉菜米豆等微此

敘魚肉等一十五件

羊肉甚補虛患風及脚氣不用喫偶食即生薑和煮又猪肉兔肉鷄肉牛肉鱸馬肉大鯉鮎魚河鮪等並
禁不可食之鹿肉微冷少喫麋肉溫不可炙喫令人消渴久喫炙肉令人血不行野雞春月以後不堪喫
鯽魚長六七寸以上並益人仍不要生喫生乾脯不可喫不消化為蟲

敘菜等二十二件

凡冬瓜食之下氣唯脚氣相宜令人寒中不可多喫能下積年藥力甚損人久服令人虛壞筋骨萬莖令
人寒中久食節骨頭生冷水令人髮鬢白蘭香胡荽芸薹三物不益人也甘菊枸杞菜發丹石少喫即溫
多即冷紫蘇薄荷荳蔻水蘇溫中益人首蓿白蒿牛蒡地黃苗甚益人長喫首蓿雖微冷益人堪久服凡
菜皆取熟喫不可生喫損人雖雖葷不同五辛溫中補筋骨可食葱調諸侯但少喫無妨多食令人虛冷
韭從二月以從青梢長煮喫甚補至四月上旬止不可食從七月二十日從即漸堪喫至九月後冷兼有
土氣蘿蔔消食下痰癖甚宜人生熟喫俱善斜蒿不甚益人亦無損蔓菁作羹令黃堪喫芥發熱動風傷
筋骨蒜傷血損藥不可食葵性滑夏不堪食冬暴乾熟時煮用蘿蔔作羹下之利大小腸醋鹹並傷筋骨
尤須節之不可縱性

敘米豆等九件茶酒附子
任意猶云稍任意喫也

白米甚益人小豆菜豆白豆並動氣仍下津液少喫任意大豆甚下氣益人久服令人身重蕎麥不可食
小麥麴喫之令人動熱不可頻食之大麥麴甚益人性小冷發癖氣粳米性寒南中濕茶不可多喫熱溫

煮桑代之酒有熱毒漬地黃丹麥大豆即得飲之以上遂是何部方
法亦一家秘寶也

敘魚肉等一十五件 敘菜等二十二件 敘米豆等九件

外臺祕要卷十一終

唐王壽先生外臺祕要方卷十二

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 衍 道 敬 通 父 訂 梓

療癖方五首

尚德按病源生字下有方字

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液流通雖復多飲水漿亦不能為病若攝養乖方則三焦痞隔三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成癖癖者謂癖側在於兩脇之間有時而痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宣導令附於後養生云卧覺勿飲水更眠令人作水癖又云飲水勿急咽久成水癖又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久之愈伏梁伏梁者宿食不消成癖腹中如杯如盤宿癰者宿水宿氣癖數生癰久則腸化為筋骨變為實也

廣濟療腹中癖氣方 牛膝分桔梗各六分枳實八分白朮六分鹽甲炙後苓各八分人參厚朴炙大黃桂心檳榔各六分右十二味搗篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十九日二服漸加至三十丸

老小微利忌生冷油膩小豆粘食蔥菜醋生葱猪肉出第二卷中

千金翼江甯衍法師破癖方 白朮 枳實炙柴胡各三分右三味切以水五升煮取二升分溫三服服

三十劑永差忌桃李雀肉出第十卷中

必效療癖方 取車下李人微湯退去皮及並人與乾麴相半搗之為餅如猶乾和淡水如常溲麴大小

一如病人手掌為二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁即利

以快利為度至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限

小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不效但病重者李人與麴相半輕者以意減病減之後服者

亦任量力頻試差神效

又方 大黃耐右一味搗篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十九以利為度小者

減之

又方

牛黃三大麝香一當門硃砂準麝生犀角小棗許別搗末以上四味並研令極細湯成後內之甘草炙龍甲炙各五丁香五右十味切以水三升先煮大黃等六味取強半升絞去滓內牛黃等四

味和絞分爲三服每服如人行十里久忌如藥法若利出如挑膠肉醬等物是病出之候特忌牛馬肉

其藥及水並是大雨大升此藥分兩是十五以上人服若十歲以下斟量病減之忌葷菜海藻松菜生

血物等

並出第三卷中

癖結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在於脇下有時弦且起或脹痛或喘息短氣故云癖

結脈緊實者癖結也

出第二卷中

廣濟療癖結心下硬痛巴豆丸方

巴豆三枚去心皮熱去杏仁七枚去尖大黃如雞子大右三味搗篩大黃取巴豆杏仁

別搗如膏和大黃入蜜和丸空腹以飲服如梧子七丸日一服漸加以微利下病爲度忌生冷油膩

出第二卷中

千金狼毒丸主堅癖方

狼毒五兩塗薑汁炙半夏流杏仁各三兩桂心四兩附子炮細辛各二兩板汗三兩右七味搗

篩別搗杏仁蜜和飲服如大豆二丸

出第十卷中

救急中候黑丸療諸癖結痰飲等大良方

桔梗桂心各四巴豆八分芫花十二分杏仁五分右五味先搗

三藥成末別搗巴豆杏仁如膏合和又搗二千杵下蜜又搗二千杵丸如胡豆漿服一丸取利可至二

三九兒生十日欲癩發可與一二九如黍米諸腹不快體中覺患便服之得一兩行利即好

出第三卷中

寒癖方五首

病源寒癖之爲病是飲水停積脇下痠強是也因遇寒即痛所以謂之寒癖脈弦而大者寒癖也

出第二卷中

尚德按千金蜀椒

肘後療腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食方 大蟾蜍一頭去皮及腹中物支解之芒硝

大人用一升中人合小五合

右二味以水七升煮取四升溫服一升一時頓服一升若未下更服一升中人七

合藏小五合得下者止後九日十日一遍作之

又方 大黃三兩甘草二兩蜜二合棗二十枚 右四味切以水四升先煮三物取二升一合去滓內蜜再上

火煎令烊分再服忌海藻松菜

又方 巴豆三枚杏仁二十枚桔梗六分藜蘆四分皂莢三分 右五味搗蜜和丸如胡豆末食服一九日三

欲下病者服二九長將服百日都好差忌猪肉蘆葦狸肉古今錄驗同並出第三卷中

深師主久寒癖胸滿短氣心腹堅嘔吐手足逆冷時來時去痛不欲食食即為患心冷引腰背強急吳茱

萸丸方 吳茱萸八分附子三分厚朴一分半夏一分桂心一分人參一分礬石一分枳實一分乾薑一分 右九味下篩

蜜和酒服如梧子二十九日三不知增之出第十卷中

延年白朮丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷上熱不能食飲頻頭風旋暈嘔吐方 白朮六分

厚朴四分人參五分白芷三分橘皮四分防風五分吳茱萸五分芍藥四分薯蕷四分茯神五分桂心一分 大麥蘖一分乾薑一分

防葵一分各甘草五分 右十五味搗篩蜜和丸如梧子酒服十五丸日再加至二十九丸出第十卷中

久癖方二首

病源久癖因謂飲水過多水氣擁滯遇寒熱氣相搏便成癖在於兩脇下經久不差乃結聚成形段而起

按之乃水鳴積有歲年故云久癖出第十卷中

集驗療冷熱久癖實不能下虛滿如水狀方 前胡各四兩生薑各四兩枳實三兩半夏四兩白朮三兩茯苓四兩甘

草各二兩桂心各二兩

右八味切以水八升煮取三升分三服千金同出第六卷中

古今錄驗曹青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒者服之二十日愈久服令人延年益壽殷仲堪云扁

鵲曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒效逆消渴隨病所在久病羸瘦老小宜服藥或吐或下或汗

通按實不
能下當是
此食不能
下尚德按
能下千金
有飲食心
三字外臺

出方 曾青分寒水石分朴硝分茯苓 大黃 附子各三分巴豆分 右七味各異搗下篩巴豆消相合
 搗六千杵次內附子搗相得次內茯苓搗相得次內大黃搗相得次內曾青搗相得次內寒水石搗相
 得次內蜜和搗千杵大人服大豆二九小兒五歲以下如麻子一丸二三歲兒如黍米一丸如服藥以
 薄粉粥清下當覆卧令汗出吐下氣發作服二九霍亂服三九泄痢不止服一九可至二九一方用曾
 青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢崔氏同出第十卷中

癖癰瘡方二首

刑繁瘰癧羸瘡膏髓酒方 猪肪膏升三牛髓升二油升五薑汁 生地黃汁各升三當歸 蜀椒汗各四分吳茱萸合五
 桂心 人參各五分五味子七分芎藭分五乾地黄分五遠志皮分五 右十四味切搗九味下篩為散取膏髓等

五種汁加水一斗同汁煎取水并藥汁俱盡但餘膏在停小冷下散攪令調火上煎三上三下燥器臍
 凝冷為餅方寸以清酒一升煖下膏取服之晝兩服夜一服非但瘰癧亦主百病忌生葱薤薤

又枸杞子散方 枸杞子升五乾薑 白朮各五分吳茱萸升一蜀椒汗三合橘皮兩五 右六味切搗五味三篩下

為散取枸杞子燥瓷器臍研暴如作米粉法七日暴之一暴一研取前藥散和之又研隨飲酒食等即
 便服一方寸匕和酒食進之如此能三年服非但瘰癧百病亦長陽氣並出第五卷中

瘰癧方四首

廣濟瘰癧瘰癧氣兩脇妨滿方 牛膝升桔梗 芍藥 枳實各八分人參分六白朮 鼈甲 茯苓 訶梨勒

皮各八分柴胡分六大黃分十桂心分六 右十二味搗篩蜜和丸如梧子空肚酒飲及薑湯任服二十九日二

服漸加至三十九利多即意減之常取微通洩為度忌生硬難消油膩等物及薤菜無一方用五加皮

中卷

千金翼瘰癧十年瘰癧方 桃仁 豉各六升蜀椒 乾薑各三兩 右四味先搗桃仁如脂令搗千杵如乾可

下少許蜜和搗令可丸空肚酒服三九如酸棗大日三本方下有變法此不載出第十九卷中

尚德按字
書綱無字
疑當作頭

尚德按今
有方十五
首

崔氏瘡癰癰積冷登如錐刀所刺鬼疰往來者方 烏頭^炮 人參 桂心 附子^炮 乾薑 赤石脂^{各八}

硃砂^{三分}

右七味搗篩蜜和為丸如梧子以煖酒服七丸稍稍加之至十九

又瘡癰癰方

鼠屎^{令黃}

右一味以水二升煮五六沸及熱濾取汁置椀中急內硃砂一小兩乃蓋

頭經宿明日平旦溫為兩服稍晚食無所忌

並出方第七卷中

瘡氣方三首

廣濟瘡瘡氣方

牛膝 芍藥^{各六分} 桔梗^{八分} 枳實^{三分} 厚朴^{六分} 橘皮^{四分} 茯苓^{六分} 人參 蒺藜子^{各五分} 訶

梨勒^{六分}

柴胡^{分四} 枳榔^{分四} 大黃^{分六}

右十三味搗篩蜜和丸空肚煮大棗飲服如梧子二十九日再漸

漸加至三十丸如利多之意減之忌生硬難消物及油膩猪肉醋物^{出第二}

延年瘡兩肋脹急瘡滿不能食兼頭痛壯熱身體痛方

枳實^{三兩} 桔梗 鼈甲^炙 人參 前胡^{各二兩} 生

薑^{四兩} 枳榔^{七枚} 桂心^{二兩}

右八味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服如人行七八里久禁生葱

莧菜^{出第十}

救急瘡腹中瘡氣連心以來相引痛緊急方

白朮 枳實^{各三兩} 柴胡^{四兩} 鼈甲^{二兩}

右四味切以水七

升煮取二升五合去滓空肚分三服相去七八里久能連服三四劑始知驗禁生冷猪肉并毒魚大須

慎之頻服有效忌莧菜生葱^{出第七}

瘰癧及瘡瘰不能食方一十四首

廣濟瘡瘰癧瘡氣不能食兼虛羸瘦四時常服方

牛膝^{六兩} 生地黃^{九兩} 當歸^{三兩} 桂心^{四兩} 從蓉^{六兩} 遠志^{三兩}

去五味子^{五兩} 鉤末^{五合} 白朮^{各三兩} 茯苓^{六兩} 大麥藥末^{一升} 右十二味搗篩為散空

腹溫酒服方寸匕日二服漸加至一匕半夏中煮生薑及枳榔飲下加麥門冬六兩此方甚宜久服令

人輕健忌牛肉生葱蘿蔔等^{出第二}

崔氏瘡宿癰時腹微滿不能食調中五參丸方 人參 沙參 玄參 丹參 苦參^{各一兩} 大黃^{四兩} 附子

一兩巴豆四十枚蜀椒汗一合乾薑半兩防風一兩麝香十五枚藜蘆一合右十三味搗下篩蜜和為丸如梧子先食服一九日三忌猪肉蘆葦生血等物

又療癰飲并醋咽吐水及沫食飲不消氣逆脹滿方 檳榔十兩良薑三兩桃仁升右三味和搗絹篩以

白蜜和丸酒服如彈丸二枚日再服漸加至四五丸加減任意自量並出第七卷中

延年人參丸主瘰癧氣不能食方 人參八分白朮枳實六分橘皮四分桂心七分甘草炙桔梗各五分右七

味搗篩蜜和為丸如梧子大一服十五丸酒下日二服加至二十九丸

又療冷氣兩肋脹滿瘰癧氣不能食方 白朮三兩人參二兩茯苓枳實炙生薑各三兩桔梗二兩桂心半兩右

七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服如人行七八里久

又桃仁丸主瘰癧氣漫心脹滿不下食發即更脹連乳滿頭面閉悶致氣急者方 桃仁八分豔甲炙枳實炙白朮各六分桔梗吳茱萸各五分烏頭一分檳榔防葵各五分芍藥四分乾薑五分紫苑細辛各四分皂莢

二分去人參橘皮甘草各四分右十七味搗篩蜜和丸如梧子服十九日再服加至二十九忌猪

肉苺菜等

又浸藥酒用下前藥方 紫蘇牛膝丹參各三兩生薑六兩生地黃香豉各三兩紫苑兩防風四兩橘皮三兩

大麻仁五合右十味細切絹袋盛以清酒二斗五升浸三宿後溫一盞用下桃仁丸酒盡更添忌燕

羹

又檳榔子丸主腹內瘰癧氣滿胸背痛不能食日漸羸瘦四肢無力時時心驚方 檳榔子六兩桔梗當

歸各四分人參五分桂心前胡各四分橘皮厚朴各三分白朮四分甘草五分烏頭乾薑炙茯苓各四分豔甲

五分大黃四分龍齒六分右十六味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸飲汁下日二服加至二十丸酒

下亦得忌醋見菜生葱等

又瘰癧瘰胸背痛時時咳嗽不能食方 桂心細辛各四分白朮六分厚朴三分附子乾薑各五分橘皮分

鼈甲四分防葵吳茱萸各三右十味搗篩蜜和為丸如梧子大服十五丸酒下日二服加至二三

十丸忌蔥菜醋物生葱等

又療瘕癖發即兩肋弦急滿不能食方 檳榔子 枳實各六分桔梗 鼈甲各四分人參 白朮各六分桂心

三龍膽草五分前胡四分萎蕤 大黃各五分甘草六分 右十二味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸酒下

日二服加至二十丸忌蔥菜生葱猪肉等

又半夏湯主腹內左肋瘕癖硬急氣滿不能食胸背痛者方 半夏三兩生薑四兩桔梗 吳茱萸各二兩前

胡 鼈甲三兩枳實二兩人參 兩檳榔子十四枚 右九味切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服

如人行八九里久忌猪羊肉錫苋菜等

又療冷瘕癖氣發即瘕氣急引膀胱痛氣滿不消食桔梗丸方 桔梗 枳實 鼈甲 人參 當歸

各四分分桂心三分白朮四分吳茱萸三分大麥蘖六分乾薑四分甘草五分 右十一味搗篩蜜和為丸如梧子大一服

十丸酒下日再服稍加至二十丸禁生葱猪肉苋菜等

又黃耆丸瘕風虛盜汗不能食腹內有瘕癖氣滿者方 黃耆五分白朮六分鼈甲五分白薇三分牡蠣四分茯苓

六分桂心三分乾薑 枳實四分橘皮三分當歸四分檳榔子 人參各六分前胡 附子四分 右十五味搗

篩蜜和為丸如梧子大一服十五丸酒下日再服加至二十丸忌醋物猪肉冷水苋菜生葱並出第十卷中

必效練中丸主癖虛熱兩脇下癖痛惡不能食四肢酸弱口乾唾涕稠粘眼澀頭時時痛并氣衝背脾虛

腫大小便澀小腹痛熱衝頭髮落耳鳴彌至健忘服十日許記事如少時無禁忌方 大黃一斤朴硝十兩

芍藥八兩桂心四兩 右四味搗篩蜜和為丸如梧子平旦酒服二十丸日再稍加至三十丸以利為度能

積服彌佳縱利不虛人神良忌生葱

又鼈甲丸主癖氣發動不能食心腹脹滿或時發熱方 鼈甲八分白朮十分枳實八分芍藥六分麥門冬去心

人參各八分前胡 厚朴各六分 右八味搗篩蜜和為丸如梧子飲服二十丸漸漸加至三十丸冷即酒

尚德按煉
疑當作鍊

外臺祕要

卷十二

癰瘰等一切病方四百

服極效禁覓菜並出第
二卷中

癰瘰等一切病方四百

千金翼癰瘰乃至癰脹滿方

烏牛尿升

右一味微火煎如稠糖空肚服大棗許一枚當鳴轉病出

隔日更服慎口味等

又三稜草煎主癰瘰方

三稜草切一石

右一味水五石煮取一石去滓更煎取三斗汁銅器中重金煎

如稠糖出內密器中旦以酒一盞服一匕日二服每服常令酒氣相續並出第十
九卷中

崔氏癰腹中癰瘰兼虛熱者不可用純冷專瀉藥宜羈縻攻之方 鹽甲炙龜甲炙桑耳金色大黃 吳

茱萸 防葵各八分附子四分

右七味下篩蜜和為丸如梧子飲苦酒服十丸日再服漸漸加一丸以

微洩為度無所忌日晚服馬莧汁三四合以差為期亦是單煮煖此汁服前藥更佳馬齒菜即馬莧也

忌猪肉冷水

今詳前方用龍甲不宜服馬莧菜云日晚服
馬莧汁并服藥此必誤也出第七卷中

又溫白丸療癰瘰等一切病方

紫苑

吳茱萸各三分

菖蒲

柴胡

厚朴

炙桔梗各二分

皂莢三分

皮子炙

烏頭十分

茯苓

桂心

乾薑

黃連

蜀椒汗各二分

巴豆一分

人參二分

右十五味合搗下篩和以白

蜜更搗二千杵丸如梧子一服二丸不知稍增至五丸以知為度心腹積聚久癰瘰塊大如杯椀黃疸

宿食朝起嘔變支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇微背連胸痛無常處繞臍絞痛狀

如蟲咬又療十種水病八種痞塞反胃吐逆飯食噎塞或五淋五痔或九種心痛積年食不消化或婦

人不產或斷緒多年帶下淋瀝或痰癰連年不差又療一切諸風身體頑痺不知痛癢或半身疼痛或

眉髮墮落又療七十二種風亦療三十六種遁注或癰或痼或婦人五邪夢與鬼交通四肢沉重不能

飲食昏昏默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐或懼或悲或啼飲食無味月水不調真似懷孕連

年累月羸瘦困弊遂至於死或歌或哭為鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣知方驗便合藥

與婦人服之十日出癰瘰蟲長二尺五寸三十餘枚下膿三升黑血一斗青黃汁五升所苦悉除當

尚德按若
疑當作若

尚德按此
方又見第
三十一卷
中分兩不
同文亦小
異

尚德按類
千金作類
尚德按類
疑當作隔

月有子臣兄墮馬被傷腹中有積血天陰即發羸瘦異常久著在牀命在旦夕臣與藥服之下如雞肝
黑血手大一百片白臘二升赤黃水一升許其病即差臣知方驗謹上禁生冷錫醋猪羊魚雞犬牛馬
鵝肉五辛葱蒜油膩豆及糯米粘滑鬱臭之屬出第二卷中

癖硬如石腹滿方二首

廣濟療腹中瘕氣癖硬兩脇臍下硬如石按之痛腹滿不下食心悶效逆積年不差龍甲丸方龍甲八分

牛膝五兩防葵各四大黃六兩當歸 乾薑 桂心 細辛 附子 炮甘草四分巴豆二枚右

十二味搗篩蜜和丸平旦空腹溫酒下如梧子四九日三服漸加以微利一兩行為度忌生葱薤菜出第二卷中

二卷

必效療腹滿癖堅如石積年不損方 取白楊木東南枝去蒼皮細剉五升熬令黃酒五升淋訖即以絹

袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日二出第三卷中

食不消成癥積方四首

集驗療凡所食不消方 取其餘頻燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即差張文仲備急同陸光祿說有

就林間得槁桃于曉服之登時吐病即差千金同出第六卷中

備急食魚鱠及生肉住胸隔中不消化吐之不出多成癥病方 朴硝如半雞子一枚大黃二兩右二味以酒二

升煮取一升去滓盡服之立消無朴硝用芒硝硝石亦佳附後

又宿食不消大便難練中丸方 大黃八兩葶藶 杏仁去皮芒硝各四兩右四味搗篩蜜和丸如梧子服

七九日三不知稍加至十丸姚方並出第三卷中

古今錄驗療卒食不消欲成癥積艾煎丸方 白艾末 蒼朮根把右二味合煮汁成如飴取半升一服

之使刺吐去宿食神驗出第十卷中

心下大如杯結癥方二首

即成癰

梧子二九日三不知千金文仲集驗古今錄驗同云療痼
 堅心下大如杯食則腹滿心腹絞痛

澤漆洗四雨

右三味搗篩蜜和搗千杵服如

又熨癰方 竈中黃土 生胡各一升

生葫升各一

仍揅病上又塗布上乾復易之取令消止

並出第一卷中

癰瘰疔氣灸法四首

尚德按捐
疑當作損

尚德按背
疑當作肩

灸閃癰法 其癰有根其根有著背者有著膊上者遣所患人平坐熟看癰頭仍將手從癰頭向上尋之當有脈築築然向上細細尋之膊上至築築頭當膊即下火還與前壯數無別王丞云背上恐不得過多下火只可細細日別七炷以來

又療癰左右相隨病灸法 第一屈肘頭近第二肋下即是灸處第二肋頭近第三肋下亦是灸處左右

各灸五十壯一時使了

千金云灸初日灸三次日五周而復始至五十止忌大諱餘不忘

大服上藥三服
餘不忌

又灸瘰癧法 從乳下即數至第三肋下共乳上下相當稍似近肉接腰骨外取穴卽是灸處兩相俱灸初下火各灸三壯明日四壯每日加一壯至七壯還從三壯起至三十日即罷 右前兩種灸法若

尚德按舒
脚點時疑
當作點時
舒脚

點時拳脚點即拳脚矣若舒脚點時還舒脚矣

並出第
七卷中

積聚方五首

病源積聚者由陰陽不和腑臟虛弱受於風邪搏於腑臟之氣所為也腑者陽也臟者陰也陽浮而動陰沉而伏積者陰氣五臟所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處諸藏受邪初未能為積聚留滯不去乃成積聚

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發瘡癰連歲月不已以季夏戊己日得之何以言之肝病當傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝欲復還肺肺不肯受故留結為積故知肝之積以季夏戊己日得之也

心之積名曰伏梁起膈上大如臂上至心下以秋庚辛日得之何以言之腎病當傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之也

脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病當傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾欲復還肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之也

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不愈令人洒淅寒熱喘欬發肺癰以春甲乙日得之何以言之心病當傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺欲復還心心不肯受故留結為積故知息賁以春甲乙日得之也

腎之積名曰賁狹發於少腹上至心下若狹賁走之狀上下無時久不愈令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病當傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎欲復還脾脾不肯受故留結為積故知賁狹以夏丙丁日得之也此為五積診其脈缺而緊積聚脈浮而牢積聚脈橫者脇下有積聚脈來小沉實者胃中有積聚不下食食即吐出脈來細而附骨者積也脈出在左積在左脈出在右積在右脈

兩出積在中央以部處之診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑皮膚寒秋
愈夏劇主皮中時痛如蟲緣狀其甚如鍼刺之狀時癢白色也診得心積脈沉而乳時上下無常處病悖
腹中熱面赤咽乾煩掌中熱甚即唾血主身癰癰主血厥夏差冬劇色赤也診得脾積脈浮大而長饑則
減飽則見腹起與穀爭累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重手足脛腫厥不能卧是主肌肉損
色黃也診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪走心下足脛寒脇痛引少腹男子積疝也女子病淋也身無膏
澤喜轉筋爪甲枯黑春差秋劇色青也診得腎積脈沉而急苦脊與腰相引饑則見飽則減病腰痛少腹
裏急口乾咽腫傷爛目眈眈骨中寒主髓厥喜忘色黑也診得心腹積聚其脈牢強急者生脈虛弱急者
死又積聚之脈實強者生沉者死其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以左足
踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐柱腰向日仰頭徐以口內氣因而咽之三十過而止開目又
云左脇側卧伸臂直脚以口內氣鼻吐之通而復始除積聚心下不便又云以左手按右脇舉右手極形
除積及老血又云閉口微息正坐向王氣張鼻取氣逼置臍下小口微出十二通氣以除結聚低頭不息
十二通以消飲食令人輕強行之冬月令人不寒又云端坐柱腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內氣閉之
自極七息名曰蜀王橋除脇下積聚又云向晨去枕正偃卧伸臂脛瞑目閉口不息極張腹兩足再息頃
間吸腹仰兩足倍拳欲息微定復為春三夏五秋七冬九鴻濂五藏津潤六腑所病皆愈腹有病積聚者
張吸其腹熱乃止癥瘕散破即愈矣出第十卷中

范汪破積丸療積聚堅癥方 大黃斤牡蠣三凝水石 石膏 石鍾乳 理石各一 右六味搗合下
篩和以蜜丸如梧子先食服酒飲任下三九日三不知稍增以知為度

又順逆丸主久寒積聚氣逆不能食方 大黃斤黃芩 厚朴炙 乾地黄 桂心 滑石各四 杏子二 黃
連 麥門冬四分 右九味搗合下篩和以蜜丸如梧子服十九日再服後食不知稍增以知為度

忘蕪羹生葱猪肉

又捶鑿丸瘕腹中積聚邪氣寒熱消穀方 甘遂 芫花 芫花 桂心 巴豆 杏仁 桔梗各一

右七味芫花芫花熬令香巴豆杏仁去皮熬令變色已各異搗下細篩搗合丸以白蜜搗萬杵服如小

豆一九日三行長將服之傷寒增服膈上吐膈下利小兒亦服婦人兼身亦服名曰捶鑿以消息之忌

猪肉蘆筍生葱並出第十卷中

延年瘕腹內積聚癖氣衝心肋急滿時吐水不能食兼惡寒方 蠶甲六分 防葵 人參 前胡 桔梗

各四 檳榔 白朮 大黃各八分 枳實四分 厚朴三分 當歸 附子炮 乾薑各四分 甘草五分 吳茱萸三分

右十五味搗篩蜜和為丸梧子大一服十五丸酒下日再服加至三十丸忌葷菜猪肉生冷魚蒜

又白朮丸主積聚癖氣不能食心肋下滿四肢骨節酸疼盜汗不絕方 白朮 黃耆各六分 牡蠣四分 人

參 茯苓 烏頭炮 乾薑各六分 芍藥四分 當歸六分 細辛 麥門冬各四分 桂心五分 前胡四分 甘草六分 防葵

三 蠶甲四分 紫苑三分 檳榔六分 桔梗三分 右十九味搗篩蜜和為丸空肚酒下二十九日再加至三十

丸忌葷菜桃李大醋猪肉生葱並出第十卷中

積聚心腹脹痛方三首

病源積者陰氣五藏所生其痛不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留

止其痛無有常處此皆由寒氣搏於藏腑與陰陽氣相擊下上故心腹痛也診其寸口之脈沉而橫脇下

有積腹中有橫積聚痛又寸口脈細沉滑者有積聚在脇下左右皆滿與背相引痛又云寸口脈緊而牢

者脇下腹中有橫積結痛而泄利脈微細者生浮者死出第十卷中

范汪通命丸瘕心腹積聚寒中疝痛又心胸滿脇下急繞臍痛方 大黃 遠志去心 黃耆 麻黃去心 甘遂

鹿茸各四分 杏仁各十枚 豉合 巴豆五十枚 芒硝三分 右十味搗合下篩和以蜜丸如小豆先食服三九日再

忌蘆筍野猪肉一方無鹿角豉者用黃芩出第十四卷中

又瘕心腹積聚食苦不消胸脇滿除去五藏邪氣四物丸方 大戟五分 芫花四分 杏仁分 巴豆百

救去心皮熱

右藥搗合下細篩以雞子中黃亦可以蜜和丸如小豆日三增一丸覺勿復益欲下頓服

七丸下如清漆陳宿水婦人乳有餘疾留飲者下水之後養之勿飲冷水長壯者服五丸先食忌野猪

肉蘆笋出第十卷中

古今錄驗勾奴露宿丸療心腹積聚膈上下有宿食留飲神方出備甘草三分大黃 甘遂 芫花熬大

戟炙葶藶子熟各二分苦參 硝石各一分巴豆半分去心皮熬 右九味細搗合蜜和丸如小豆服三丸當吐下不

吐下稍益至五六丸以知為度先少起忌海藻蘆笋荤菜野猪肉范汪同出第十卷中

積聚心腹脹滿方一首

病源積聚成病蘊結在內則氣行不宣通還搏於腑臍故心腹脹滿則煩悶而短氣也出第十卷中

深師烏頭丸療心腹積聚脹滿少食多厥繞臍痛按之排手寒中有水上氣女人產後餘疾大人風癰少

小風驚癰百病者元嘉中用療數人皆良有一人服五服藥即出蟲長一尺餘三枚復出如牛膽黑堅四

枚中皆有飯食病即愈方 烏頭七枚乾薑 皂莢炙去皮子各五分菖蒲三分桂心四分柴胡 附子炮人參 厚

朴炙黃連 茯苓各三分蜀椒汗五分吳茱萸四分桔梗三分 右十四味搗篩蜜和為丸服如梧子二丸日三

稍加至十五丸忌猪肉冷水醋物生葱羊肉餒出第二十卷中

積聚宿食寒熱方四首

病源積聚而宿食不消者由腑藏為寒氣所乘脾胃虛冷故不能消化留為宿食也診其脈來實心腹積

聚飲食不消胃中冷故也出第十卷中

千金翼三台丸療五藏寒熱積聚臍脹腸鳴而噎食不作肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不復發食

後服五丸飲多者吞十丸長服令人大小便調和長肌肉方 大黃二兩熟硝石 葶藶各一升前胡二兩厚

朴炙附子炮各一兩茯苓半兩夏洗 杏仁一升去尖皮數細辛一兩 右十味搗篩蜜和搗五千杵酒服如梧子五

丸稍加以知為度忌猪肉餒生菜酢物深師同出第二十卷中

通按方內
甘草即
甘草皮
疑是甘草
尚德按甘
皮即柑皮
說見第十
卷中

古今錄驗氣痞丸療寒氣痞積聚結不通繞臍切痛腹中脹滿胸滿風入藏憂志所積用力不節筋脈

傷羸瘦不能食飲此藥令人強嗜食益氣力方 烏頭炮甘草炙葶藶子煮大黃 芎藭 芍藥 甘皮

二分各 右七味下篩蜜和丸如梧子一服三九日再不知漸至五九七九一方桂心二分去甘皮忌海

藻菰菜豬肉冷水等一方有通草無甘皮 又小烏頭丸療久寒積聚心腹繞臍切痛食飲不下方 烏頭炮甘草炙各三兩葶藶子半兩半夏 附子

炮各二兩 右七味下篩蜜和丸如梧子大先食服五九日再不知稍增之忌羊豬肉冷水 又五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方 椒目 附子炮厚朴炙各一兩杏仁三兩半夏一兩

薤三兩芒硝五兩大黃九兩 右八味搗葶藶子杏仁使熟和諸藥末和以蜜搗五千杵吞如梧子二丸忌

猪羊肉錫冷水出第十卷中 療癥方三首

病源癥者由寒溫失節致腑藏之氣虛弱而食飲不消聚結在內漸染生長現段盤牢不移動者是癥也

言其形狀可徵驗也若積引歲月人則柴瘦腹轉大遂至於死診其脈弦而伏其癥不轉動者必死出第十九卷中

范汪療癥病丸方 射罔二兩蜀椒三兩 右二味搗末下細篩以雞子白和丸半如麻子半如赤小豆

先服如麻子漸服如赤小豆二九不知稍增之以知為度出第十卷中 集驗療心腹宿癥及卒得癥方 取雄雞一頭飼之令肥肥後餓二日以好赤米泔飯極令米多以飼雞

安雞著板上取糞暴燥末溫清酒服五分已可至方寸已日三若病困急者晝夜可五六服一雞少更

飼餘雞取足出第六卷中 備急慰癥方 吳茱萸三 右一味以酒和煮熟布裏以慰癥上冷更炒更番用之癥移走逐慰都消乃

止也肘後方云亦可用射罔五兩茱萸末以雞子白和塗癥上出第三卷中

癥癥方三首 癥癥方六首 癥癥方四首

癥癥方三首 癥癥方六首 癥癥方四首

癥癥方三首 癥癥方六首 癥癥方四首

癥癥方三首 癥癥方六首 癥癥方四首

癥癥方三首 癥癥方六首 癥癥方四首

癥癥方三首 癥癥方六首 癥癥方四首

尚德按本
病源作虛

尚德按上
肘後作止

暴癰方六首

病源暴癰者由藏氣虛弱食生冷之物藏既本弱不能消之積聚成塊卒然而起其生無漸名之暴癰也
本由藏弱其癰暴生至於成病斃人則速出第九卷中

肘後療卒暴癰腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不瘳之百日死方 取牛膝根二斤以咀 右一味

酒一斗浸之密器中封口舉者熱灰中溫之令味出先食服五六合至一升以意量多少又用蒴藿根

亦準此大良千金集驗經心

又凡癰堅之起多以漸生而有覺便牢大者自難療也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦瘳多用陷冰玉

壺八毒諸大藥今上取小小易得者方 取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之搗作末以秫

米五斗炊飯內攪之好酒五斗漬封藥消飯浮可飲一升半勿食鮭鹽癰當出亦可但取其根一升乾

搗千杵酒漬飲之從少起日三亦佳此酒瘳癰乃勝諸大藥張仲文

又方 大黃半斤朴硝三兩蜜一斤 右三味合於湯上煎可丸如梧子服十九日三備急文仲崔氏同惟崔氏

二十九日再服餘候

千金翼瘳卒暴癰方 蒜十片去皮五月 伏龍肝鴨卵大 桂心二尺 右三味合搗以淳苦酒和之如泥

塗著布上掩病處三日消肘後十金同凡蒜或無桂心亦得用也

又方 商陸根搗蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上以衣覆冷即易取差止數日之中晨夕勿息千金集

同並出第九卷中

古今錄驗瘳暴得癰方 取蒴藿根一小束淨洗漚去水細切以醇酒浸之取淹根三宿服五合至一升

日三若欲速得可於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作將服之出第十卷中

鼈癰方四首

病源鼈癰者謂腹內癰結如鼈之形狀也有食鼈觸冷不消而生癰者有食雞冷物不消變化而作者此

尚德按康
照字典廣
韻下云嘔
韻馬格切
切韻會正
韻乙革切
並音說
文笑也
唐韻於革
切集韻正
並音厄王
篇飢貌與
嘔與同
蓋與同
經音義相
通注謂集
韻無嘔字

皆脾胃氣弱而遇冷不能耐消故也癥者其病結成推之不動移是也

出第十卷中

廣濟療癥服白馬尿方 白馬尿一升五合溫服之令盡差

又方 白馬尿升雞子三枚破 右二味於鑊中煎取三合空腹服之不移時當吐出病無所忌

又療癥癭蟹爪丸方 蟹爪分三附子炮六分 麝香三分 半夏六分 生薑四分 鹽甲炎 防葵各六分 郁李仁八分 右

八味搗篩蜜和為丸如梧子空肚以酒下二十九日再服以知為度忘生冷猪肉莧菜

並出第二卷中

集驗療癥癭伏在心下手搗見頭足時時轉者并心腹宿癥及卒得癥方 白雌雞一隻絕食一宿明旦

以膏熬飯飼之取其屎無問多少以小便和之於銅器中火上熬令燥搗篩服方寸匕日四五服消盡

乃止常飼雞取屎差畢殺雞單食之

附後同出第六卷中

米癥方二首

病源人有好啞米乙革切說文於革切笑也集韻無此字但有飢轉久彌嗜啞之若不得米則胸中清水

出得米便止米不消化遂生癥結其人常思米而不能飲食久則斃人

出第十卷中

廣濟療米癥其疾常欲食米若不得米則胸中清水出方 雞屎升白米合 右二味合炒取米焦搗篩

為散用水一升頓服取盡少時即吐吐出癥如研米汁碎若無癥即吐白沫痰水乃憎米不復食之無

所忌

千金

又療米癥久不瘳羸瘦以至死方 葱白兩虎口切 烏梅三十枚碎 右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨

嗽葱白隨飲烏梅汁令盡頃之心腹煩欲吐即令出之三晨療之當吐去米癥差無所忌

並出第三卷中

食癥及魚肉成癥方二首

病源有人卒能大食乘其常分因饑值生葱便大食之乃吐一肉塊繞畔有口其病則愈故謂食癥特由

不幸致此故異成癥非飲食生冷過度之病也

出第十卷中

廣濟療食癥病食葱差方 有一人食飯七升并羊脂餅番不論數因於道中過饑急食生葱須臾吐出

者思誤且
有飢之飢
疑當作飢

尚德按并
字下千金
有備字

一寶薄而圓繞畔有口無數即以食投之立消盡飯七升乃止吐此物後其人食病便愈此名食癰無

忌

出第二卷中

千金瘡食魚肉等成癰結在腹內并諸毒氣方 狗糞五 右一味燒灰末之綿裹以酒一斗漬再宿瀝

取清分十服日三服三日令盡隨所食癰結即便出矣

出第十卷中

髮癰方二首

病源有人因食飲內誤有頭髮隨食而入胃成癰胸喉間如有蟲下上來去者是也

出第十卷中

廣濟瘡髮癰乃由人因食而入久即胸間如有蟲上下去來唯欲得飲油方 油升 右一味以香澤煎

之大錘鑄貼之安病人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傳之鼻面並令有香氣當叫喚取飲不得與

之必疲極眠睡其髮癰當從口出飲油人專守視之并石灰一裹見癰出以灰粉手捉癰抽出須臾抽

盡即是髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌

千金同

又瘡胸喉間覺有癰蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲故也方 油煎葱豉令香二日不食張口而卧將

油葱豉置口邊蟲當漸出徐徐以物引去之無所忌

出第二卷中

蠱癰方一首

病源人有多蟲性好蟄之所蟄既多而腑臟虛弱不能消之不幸變化生癰而患之者亦少俗云患蠱癰

人見蠱必蟄之不能禁止蠱生長在腹內時有從下部出亦斃人

出第十卷中

千金瘡蠱癰由蟄蠱在腹生長為蠱癰方 故篋子 故梳子 各一 右二味各破為兩分各取一分燒

作灰末之又取一分以水五升煮取一升用頓服前未盡少時當病出無所忌

廣濟同出第二卷中

蠱癰方一首

病源蠱癰者謂腹內瘕結如蠱狀是也有食蠱觸冷不消而生者亦有食諸雜冷物變化而作者皆由脾

胃氣弱而過冷即不能尅消所致瘕言假也謂其形假而推移也昔曾有人共奴俱患蠱癰奴在前死遂

尚德按生
字下病源
有方字

尚德按黃
茯苓金作
茯苓

破其腹得一白鼈仍故活有人乘白馬來看此鼈白馬忽尿墮落鼈上即縮頭及脚尋以馬尿灌之即化為水其主曰吾將愈矣即服之果如其言得差故養生云六月勿食澤中水令人成鼈瘕

崔氏療鼈瘕方

大黃銖乾薑兩附子

炮人參各九

側子

桂心

六貝母

兩白朮

兩細辛

十八

麝香

大

瘕瘕

寸者七

右十味擣下篩以酒服半方寸匕日三忌猪肉冷水

卷中

九

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

蛇瘕方一首

病源人有食蛇不消因腹内生蛇瘕也亦有蛇之津液誤入飲食內亦令人病瘕其狀常若饑而食則不

下喉噎塞食至胸內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

崔氏療蛇瘕大黃湯方

大黃

兩芒硝

如雞子

烏鰂魚骨

三黃芩

兩甘草

如人指

皂莢

六枚

如猪牙

右

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

食平旦服當下病也

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

蛟龍病方一首

病源蛟龍病者云二月八月蛟龍子生芹菜上有人食芹菜不幸隨入人腹變成蛟龍其病之狀發則如

癩

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

瘕瘕

廣濟療蛟龍病三月八月近海及水邊因食生芹菜為蛟龍子生在芹菜上食入人腹變成龍子須慎之

其病發似癩面色青黃少腹脹狀如懷妊宜食寒食湯方

寒食粥

湯三升

日三服之

吐出蛟龍

有兩頭

及尾

開皇六年

又賈橋

有人喫錫吐

胸痺方二首

病源寒氣客於五藏六腑因虛而發上衝胸間則胸痺胸痺之候胸中悞悞如滿噎塞不利習習如蟻喉

裏澀唾燥甚者心裏強痞急痛肌肉苦痺絞急如刺不得俛仰胸前皮皆痛手不能犯胸滿短氣欬唾引

痛煩悶自汗出或徹背脅其脈浮而微者是也不治數日殺人其湯鬱鐵石別有正方補養宣導今附於

尚德按病
源無地字
尚德按要
湯略人參

外臺秘要

卷十二

胸痺短氣方三首 胸痺心下堅痞緩急方四首

後養生方云以右足踐地左足上除胸痺食熱嘔出第三卷中

仲景傷寒論瘧胸痺理中湯方 人參 甘草 炙白朮 乾薑各三兩 右四味切以水八升煮取三升去

滓溫服一升日三夜一頻服三劑愈氣滯心中痞滿下

深師瘧胸痺瘧香散方 麝香四分 牛黃一分 生犀角一分 右三味研服五分匕日三忌生冷物葱蒜出第十六卷中

中卷

胸痺短氣方三首

千金論曰夫脈當取太過與不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所

以胸痺心痛者以其脈陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也仲景傷寒論同胸痺之病喘急欬

唾胸背痛短氣其脈沉而遲關上小緊數者栝實湯主之方 栝實一枚 薤白一斤 半夏半升 生薑四兩 枳實二兩

炙 右五味切以白截漿一斗煮取四升服一升日三肘後仲景傷寒論無生薑枳實半夏等三味同

小品云用水一斗忌羊肉錫

又胸中氣塞短氣茯苓湯主之方 茯苓三兩 甘草一兩 杏仁五十枚 右三味咀咀以水一斗煮取五升溫

服一升日三服不差更合仲景傷寒論同並出第十卷中 栝實各二兩 桂心各二兩 茯苓各五兩 枳實各二兩 白朮各二兩 生

薑 栝實各三兩 右九味搗篩酒服方寸匕日三古今錄驗千金同

胸痺心下堅痞緩急方四首

千金論胸痺之病令人心下堅痞急痛肌中苦痺緩急如刺不得俛仰其胸前皮皆痛手不得犯胸中幅

幅如滿咽塞習習噎喉中乾燥時欲嘔吐胸滿短氣欬唾引痛煩悶自汗出或徹引背腹痛不即瘳之數

日殺人出第十卷中

范汪瘳胸痺心中痞堅留氣結於胸中胸滿脇下逆氣搶心枳實湯方 陳枳實四枚 厚朴四兩 薤白八兩

尚德按要
略名枳實

菹白桂枝

桂心一枯薑實一枚 右五味先以水五升煮枳實厚朴取二升半去滓內餘藥又煎三兩沸去滓分溫

三服除心氣良古今錄驗千金同此

古今錄驗療胸中隱然而痛脊膂肩痛方 桂心 乾薑各一人參 細辛各三 烏頭一分 山茱萸 貝

母各三 右七味搗下篩和以蜜丸如小豆大酒若粥汁吞二丸稍稍益以胸中痛止溫溫為度忘生

葱生菜猪肉冷水

又療胸痺偏緩急意以仁散方 薏苡仁五百枚 附子十枚大 甘草三兩 右三味搗下篩服方寸匕日三

忌海藻松菜猪肉冷水

又療胸痺偏緩急薏苡仁散方 薏苡仁一千五百枚 附子大者十枚也 右二味搗下篩服方寸匕日三不知稍

增之忌猪肉冷水此方出僧深范注同仲景方用薏苡仁十五兩並出第八卷中

胸痺噎塞方二首

仲景傷寒論胸痺之病胸中怫懣如滿噎塞習習如癢喉中澀唾燥沫是也橘皮枳實湯主之方 橘皮

枳實四枚 生薑半斤 右三味切以水五升煮取二升分再服肘後小品文仲深師范注古今錄驗經心錄千金同出第十五卷中

千金通氣湯療胸滿短氣噎塞方 半夏八兩 生薑六兩 桂心三兩 吳茱萸四十枚 右四味切以水八升煮取

三升去滓分溫三服忘羊肉錫生葱一方無桂心用橘皮出第十三卷中

胸痺欬唾短氣方四首

仲景傷寒論胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸脈沉而遲關脈小緊數者桔萸薤白白酒湯主之方

桔萸實一枚 薤白切半 右二味以白截酒七升煮取二升去滓溫分再服深師范注同出第十五卷中

肘後論胸痺之病令人心中心中堅痞急痛胸中苦痺絞急如刺不得俛仰其胸前及背脊痛手不得犯胸滿

短氣欬唾引痛煩悶自汗出或徹引背脊不即瘳數日殺人瘳卒速胸痺方 雄黃 巴豆去皮 右二

味搗雄黃細篩內巴豆務熟搗之相和丸如小豆服一丸不覺稍益忘野猪肉蘆葶

尚德按此千金之文仲景無此論此方要略名橘枳湯與上茯苓杏仁治橘皮一斤枳實五枚通按或音再酢漿也釋米汁也尚德按要略止白白酒無哉字

胸痺心痛方四首 胸痹方二首 貴氣方四首

又方 枳實 炙 右一味搗篩以米汁先食服方寸匕日三夜一

又或已差復更發方 取薤根 五斤 右一味搗絞取汁飲之立愈 並出第一卷中

胸痺心痛方四首

仲景傷寒論胸痺不得卧心痛徹背者栝蒌薤白半夏白朮漿湯主之方 大栝蒌一枚薤白 切 三 半夏 半升

尚德按白朮漿要略作白酒下

千金療胸痺心痛方 炙臚中百壯穴在鳩尾上一寸 一云臚中行直兩乳內間是臚中

尚德按千金無不容旁三字

又療胸脇滿心痛方 炙期門隨年壯穴在第二肋端乳直下不容旁一寸半是 並出第十卷中 蜀椒 汗各乾薑分細辛分附子分

古今錄驗小草丸療胸痺心痛逆氣膈中飲不下方 小草 桂心 蜀椒 汗各乾薑分細辛分附子分

生葱生菜 范汪同出第八卷中

胸痛方二首

范汪療胸痛枳實散方 枳實 八分 桂心 五分 右二味搗下篩酒服方寸匕日三忌生葱 深師同

深師療胸痛枳實散方 枳實 炙 神麴 炙 白朮 各一兩 右三味搗篩酒服方寸匕日三忌桃李雀肉等

出第十卷中

貴氣方四首

尚德按四疑當作三

病源夫貴氣者腎之積氣也起於驚恐憂思所生也若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志動傷氣積於腎而氣上下遊走如蛇之貴故曰貴氣其氣乘心若心中踊踊如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒嘔氣滿胸中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔蛇之狀也若氣滿支心心下煩亂不欲聞人聲休作有時乍差乍劇呼吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔此憂思貴氣之狀也診其脈來祝祝視者病貴蛇也腎脈微急沉厥貴蛇也其足不收不得前後 出第十卷中

鴻鉛丹丸
方千金治
癰癤瘰癧
方有鉛丹
飛鷄頭即
是藥字字
書未見證
類引唐本
注云爾雅
羊如牛大
其角堪為
疑當作排
沫馬銀也
蓋誤及排
沫並以於
羊角為者

小品黃帝問金治子曰驚為病如奔狔其病奈何金治子對曰驚為奔狔心中踊踊如事所驚如人所恐五藏不定飲食輒嘔氣滿胸中狂癡欲走閉眼謬言開眼妄語或張面目不相取與眾師不知呼有所負奔狔湯主之黃帝曰善黃帝問金治子曰憂思奔狔何以別之金治子對曰憂思奔狔者氣滿支心下煩亂不欲聞人之聲發作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔眾師不知呼有觸忤奔狔湯主之黃帝曰善

師曰病如奔狔者氣從少腹起上衝喉咽發作欲死復還生皆從驚恐得之腎間有膿故也范注

師曰病有奔狔有吐膿有驚怖有大邪此四部病者皆從驚發得之火邪者桂枝如龍骨牡蠣湯主之若新亡財為縣官所捕迫從驚恐者療用鴟頭鉛銕千金翼有鴟頭鉛銕一云向為馬桃未即驗羊角未定者上所言奔狔者病人氣息逆喘迫上如狔奔走之狀奔狔湯主之

又療卒傷損食下則覺胸中偏痛慄慄然水漿下亦爾問病與相應急作此方 生李根一斤細切麥門冬一斤

去心人參 桂心各二兩甘草二兩 右五味咀咀以水一斗煮取三升分三服范注

又奔狔湯療虛勞五藏氣乏損遊氣歸上上走時若羣狔相逐憧憧時氣來便自如坐驚夢精光竭不澤陰痿上引少腹急痛面乍熱赤色喜怒無常耳聾目視無精光方 葛根八兩 乾薑二兩 升麻二兩 人參三兩 夏

洗一升 芍藥三兩 當歸二兩 桂心五兩 生薑一斤 甘草二兩 右九味切以水二斗煮得五升溫服八合日三不知

稍增至一升日三忌羊肉鵠生蔥海藻松菜等出第十卷中

肘後療卒厥逆上氣氣支兩脇心下痛滿淹淹欲絕此謂奔豚病從卒驚怖憂迫得之氣從下上上衝心

胸臍間築築發動有時不療殺人方 甘草炙 人參各二兩 吳茱萸生薑一斤 半夏升 桂心三兩 右六味切

以水一斗煮取三升分三服此藥須預畜得病便急合服之千金方桂五兩甘

責狔氣衝心胸方四首

廣濟責狔氣在心吸吸短氣不欲聞人語聲心下煩亂不安發作有時四肢煩痠手足逆冷方 李根白

外臺必要

卷十二

責狔氣衝心胸方四首 雜療奔狔氣及結氣方六首

十二

尚德接服
字下疑脫
尚德接湯
字下疑脫
洗字

尚德按切
字下疑有
脫字

皮八兩半夏七兩乾薑四兩茯苓三兩甘草二兩附子一兩桂心四兩右八味切以水一斗煮取三升

絞去滓分三服別相去如人行六七里忌生冷羊肉錫海藻菜油膩醋物生葱粘食同注

又療黃豚氣在胸心迫滿支脇方生薑一斤半夏四兩桂心三兩人參二兩甘草二兩吳茱萸一斤右六味切

以水一斗煮取三升絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生葱鷄羊肉錫粘食海藻菜同注

同並出第

集驗黃独茯苓湯療短氣五藏不足寒氣厥逆腹脹滿氣育走衝胸膈發作氣欲絕不識人氣力羸瘦少

腹起騰踊如独子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰器手足逆冷或煩熱者方茯苓四兩生薑八兩甘草二兩

炙生薑五兩半夏五升湯洗人參三兩當歸二兩芎藭各二兩根白皮切右九味切以水一斗二升煮取五升服

一升日三夜二服忌羊肉錫海藻菜酢物等

又療黃独氣上衝胸腹痛往來寒熱黃独湯方甘草二兩芎藭二兩當歸各二兩半夏四兩黃芩三兩生薑五兩

藥三兩生薑四兩甘草根白皮切右九味切以水二斗煮取五升去滓溫服一升日三夜二服忌海藻菜

菜羊肉錫等並出第

雜療奔独氣及結氣方六首

深師療憂勞寒熱愁思及飲食隔塞虛勞內傷五藏絕傷奔氣不能還下心中悸動不安七氣湯方桔

梗二兩人參三兩方二兩芍藥三兩萊菔七兩黃芩二兩乾地黄三兩枳實五兩桂心二兩乾薑三兩一兩甘

草二兩炙橘皮三兩半夏三兩方一升右十二味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菜羊

肉錫生葱猪肉蕪荑等并無桂心橘皮桔梗集驗療黃独氣從下上者湯方生薑半斤五兩黃芩二兩桂心二兩芍藥三兩人參二兩生薑二兩甘草三兩

皮切各右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫分為五服日三夜二服忌羊肉錫生葱並出第

小品牡蠣黃独湯療黃豚氣從少腹起悸胸手足逆冷方牡蠣三兩桂心八兩李根白皮一斤甘草三兩

右四味切以水一斗七升煮取李根皮得七升去滓內餘藥再煮取三升分服五合日三夜再忘生葱

又療手足逆冷胸滿氣促從臍左右起鬱冒者奔豚湯方 甘草四兩 李根白皮切 葛根各一 黃芩三兩 桂

心 桔梗 人參各二兩 芍藥兩 右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫服一升日三夜再忘海

藻松菜生葱 范注

又方桐君說 伏出雞卵殼中白皮 梨木灰 麻黃各等 紫苑各等 右四味擣下篩作丸散隨宜酒

服十九如梧子散者方寸匕療三十年喉中結氣欬逆立差也亦可水煮為湯以意分之輕心錄同並

千金奔氣湯主火氣上奔胸膈中諸病每發時迫滿短氣不得卧劇者便惕欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐

成結氣方 桂心五兩 生薑一斤 人參三兩 夏洗 吳茱萸各一 甘草三兩 右六味切以水一斗煮取三升去

滓分為四服忌羊肉錫生葱海藻松菜 出第十卷中

灸奔豚法

千金療奔豚腹腫法 灸章門一名長平二穴在大橫外直臍季肋端百壯

又主奔豚衝心不得息 灸中極一名玉泉在臍下四寸五十壯

又主奔豚上下腹中與腰相引痛者法 灸中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間動脈是百壯一云百

五十壯

又主奔豚上下者法 灸四滿夾丹田旁相去三寸七壯

又主奔豚法 灸氣海在臍下一寸半百壯

又法 灸關元在臍下三寸五十壯亦可百壯並出第十卷中

尚德按法
字下疑脫
六首二字
尚德按息
字下疑脫
法字

外臺祕要方卷十二終

唐王壽先生外臺祕要方卷十三目錄鬼魅二十六門

虛勞骨蒸方七首

骨蒸方一十七首

火骨蒸法圖四首

瘕氣骨蒸方三首

虛損慘頽作骨蒸方四首

瘦病方五首

傳屍方四首

伏連方五首

飛尸方三首

遁尸方三首

五尸方一十一首

尸瘕方四首

五瘕方四首

江南九十九瘕方二首

江南三十六瘕方三首

瘕病相染易方三首

鬼瘕方二首

鬼瘕心腹痛方一首

鬼瘕羸瘦方二首

鬼氣方三首

鬼魅精魅方八首

鬼神交通方四首

白虎方五首

無辜方二首

除骨熱方四首

盜汗方七首

尚德按今有方二首

唐王燾先生外臺祕要方卷十三

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程行道敬通父訂梓

虛勞骨蒸方七首

病源夫蒸病有五一日骨蒸其根在腎旦起體涼日晚即熱煩躁寢不能安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內即變為疳食人五藏二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫臥即浪言或驚恐不定脉數蒸盛之時或變為疳臍下悶或暴痢不止三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸滿或自稱得瘕熱兩脇下脹大效微背連脚疼眠寐不安或蒸毒傷藏口內唾血四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食即欲嘔小便如血大便秘澀蒸盛之時或體腫目赤寢臥不安五曰內蒸亦名血蒸所以名內蒸者必外寒而內熱把手附骨而熱是其根在五藏六腑其人必因患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跂腫起又有二十三蒸一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男子則遺瀝漏精女則月候不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱五骨蒸齒黑六筋蒸甲焦七血蒸髮焦八脉蒸不調或急或緩脉九肝蒸眼黑十心蒸舌乾十一脾蒸唇焦十二肺蒸鼻乾十三腎蒸兩耳焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸眼白失色十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下唇焦十八大腸蒸鼻右孔乾痛十九三焦蒸亦雜病乍熱乍寒二十肉蒸二十一膚蒸二十二皮蒸二十三氣蒸遍身氣熱凡諸蒸患多因熱病患愈後食牛羊肉及肥膩或酒或房觸犯而成此疾久蒸不除多變成疳必須先防下部不得輕妄療之

出第四卷中

崔氏療五蒸夫蒸者是附骨熱毒之氣皆是死之端漸庸醫及田野之夫不識熱蒸體形狀妄注神崇以相疑惑蒸盛摠變為疳而致死者不可勝記其蒸有五請略陳之

一曰骨蒸早起體涼日晚便熱煩躁不安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力或時腰痛兩足逆冷

手心常熱蒸感傷內乃變成疳食人五藏若大便澀方可服芒硝一服一方寸匕日再服亦可搗苦參

蜜和為丸如梧子大一服七九日再以飲送之無忌以體輕涼為度

二曰脈蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫臥即浪語或驚恐不安其脈又數此蒸若

盛亦變為疳傍臍時悶或痢不止方 苦參 青箱各二兩 艾葉 甘草各一兩 右四味切以水四升煮取

一升半分為三分用羊胞盛之以葦灌下部中若不利取芒硝一方寸匕和冷水合和服之日再服忌

海藻松菜

三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸中滿悶或自稱得瘧手掩

兩脇不得大效微背連脚疼眠寐不安此蒸毒傷五藏口便唾血方 急與芒硝一兩以水一升半和分

為三服日三服止訖以冷水浸手以熨脇間及腋下并胸上及痛處亦可舉臂指灸側腋下第三肋間

腋下空中七壯立止

四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食飲無味食訖便嘔小便如血大便秘澀蒸盛之時

或體腫目赤不得安寐方 大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦絞取汁一服五合許微利

即止若熱不定亦可服芒硝一方寸匕日三以體涼為度

五曰內蒸所以言內蒸者必外寒內熱把手附骨而熱也其根在五藏六腑之中其人必因患後得之骨

肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跖腫起方 石膏十兩研如乳粉法水和服方

寸匕日再以體涼為度出第七卷中

古今錄驗解五蒸湯方 甘草一兩 茯苓二兩 人參二兩 竹葉二兩 葛根 乾地黄各三兩 知母 黃芩各二兩 石膏

五兩 粳米一合 石十味切以水九升煮取二升半分為三服亦可以水三升煮小麥一升乃煮藥忌海

藻松菜蕪蕒火醋汪同方無甘草茯苓人參竹葉止六味 又五蒸丸方 烏梅 雞骨一本是鷄骨 紫苑 芍藥 大黃 黃芩 細辛各五分 知母四分 礬石 欬各一

尚德按火
以當作大

桂心分二 右十一味末之蜜和丸如梧子飲服十丸日二忌生葱生菜並出第五卷中

骨蒸方一十七首

廣濟療骨蒸肺氣每至日晚即惡寒壯熱頰色微赤不能下食日漸羸瘦方 生地黃三兩 葱白切 香豉

甘草炙各三兩 童子小便升二 右五味切以地黃等於小便中浸一宿早晨煎兩沸絞取滓澄取一升二合

分溫二服服別相去如人行七八里服一劑差止不服忌海藻松菜蕪蕪猪肉油膩黏食等出第四卷中

崔氏療骨蒸以骨汁淋方 取枯朽骨碎遺大升一切骨皆堪用唯洗刷不盡病 柳枝 刺針 桃枝各

斗三大 右四味以清水五大石煮之減半乃濾出汁別取清漿兩大石投釜中和骨重煮三兩沸然後

揔濾出淨拭釜取此前後湯相和更報煖隨次取用使患者解髮令散以此湯發頂淋之其湯令熱但

不破肉為準一舉淋湯遺盡若覺心悶即喫三兩口冷飯如不能坐即臥淋淋湯之時自當大汗汗出

少處仍偏淋之務取汗勻以祛惡氣林訖可食一大碗熱葱豉粥仍暖覆取汗汗解以粉摩身連手足

使周徧患重者不過再淋欲重淋時量氣力淋此湯若飲之尤佳出第七卷中

文仲療骨蒸方 生地黃一升搗絞取汁三度搗絞始汁盡分再服若利即減之以身輕涼為度忌蕪蕪

又療骨蒸苦熱瘦羸面目痿黃嘔逆上氣煩悶短氣喘急日晚便劇不能飲食若服生地黃汁即便服此

方 龍膽 黃連 枯婁 苦參 青箱 芍藥各一 梔子仁枚十 芒硝 大黃各二 黃芩三 右十味搗

篩為散飲服一錢匕加至方寸匕日再大須慎生食若不禁生食不須服之忌猪肉冷水並作丸服之

又療骨蒸唇乾口燥欲得飲水止渴竹葉飲方 竹葉一握 麥門冬一升 大棗二十 甘草三兩 半夏一升 湯

盡粳米合生薑三兩 右七味切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉鰕海藻松菜

又方 麥門冬一升 小麥二升 枸杞根切三 右三味以水一斗煮取三升煮小麥熟去滓分溫日三服

又方 大烏梅二十 石膏綿裹 右二味以水七升煮取四升去滓以蜜三合稍稍飲之佳

又方 大烏梅二十 石膏綿裹 右二味以水七升煮取四升去滓以蜜三合稍稍飲之佳

又方 患癰瘰上於切切下等病必瘦脊骨自出以壯丈夫屈手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下

盡骨極指復向上來去十二三迴然以中指於兩畔處極彈之若是此病應彈處起作頭多可三十餘

頭即以墨點上記之取三指大青竹筒長寸半一頭留節無節頭削令薄似劍者此筒子數沸及熱出

筒龍墨點處按之良久以刀彈破所角處又煮筒子重角之當出黃白赤水次有膿出亦有蟲出者數

數如此角之令惡物出盡乃即除當日明身輕也

又療骨蒸消渴消中熱中渴刺心熱心忪風虛熱傳屍等方 古參一大黃連去知母 枯姜 麥門冬

心壯嘔各五大 右六味搗篩以生牛乳和併手捻為丸如梧子大暴乾一服二十丸稍稍加至三十

丸日再服飽食訖以漿水下如食熱麵酒加至五十丸忌猪肉冷水救急

又療骨蒸蒼梧道士方 紫苑 桔梗 續斷 青竹茹 五味子各三桑根白皮五甘草二乾地黄

五兩熱赤小豆升一 右九味切以水九升煮取三升五合分溫三服服五六劑十年者亦差每隔五日

一劑初發即服大驗勿輕之可頻服立驗蘇遊玄感論云主肺氣欬者相當餘同忌海藻松菜猪肉燕

又療骨蒸欬出膿病重者方 皂莢一兩炙去白鴆一兩乾薑七枚生薑二分 右四味以酒一大升煮取

半升去滓先食飯然後服二合如人行三四里不吐更服二合又如人行二三里不吐搥服盡方便令

吐即膿出並出第

救急骨蒸之候男子因五勞七傷或因肺壅之後或為瘴癘之後宿患瘧婦人因產後虛勞漏汗寒熱

或為月閉不通無問男子婦人因天行已後餘熱不除或為頻頻勞復小兒因瘧其病並緣此十候所致

因茲漸漸瘦損初著盜汗盜汗以後即寒熱往來寒熱往來以後即漸加欬欬後面色白兩頰見赤如臘

脂色團團如錢許大左臥即右出唇口非常鮮赤若至鮮赤即極重十則七死三活若此以後加吐吐後

病百無一生不過一月死服此丸仍得不著後人此病人急多是冤鬼病治之方 青柏苗六月六知母

黃連去毛大黃

梔子仁

枯萸

常山

姜蕤各八分

苦參皮十二分

甘草炙

蜀漆洗各五分

右十一味

搗篩

蜜和為丸如梧子大

飲服五丸

漸加至十五丸

日再服

以知為度

因至利忌猪肉

麝葱蒜生菜

海藻松菜

又療骨蒸方

毛桃仁一百二十枚去皮及雙仁留尖

右一味

搗令可丸

平旦以井華水頓服

使盡服訖量性飲酒使

醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又療骨蒸極熱方

非其人莫誤傳

取乾人薑燒令外黑

內水中澄清

每旦服一小升

薄晚後服小便一小升

以差為限既常服不可朝朝取作大坑燒二升夜以水三升漬之稍稍減服小便勿用自身者小兒者佳

又方用雄黃一大兩和小便一大升研令為粉乃取黃理石一枚方圓可一尺左側以炭火燒之三食

頃極熱灌雄黃汁於石上恐太熱不可近宜著一片薄覆置石上令患人脫衣坐上石冷停以衣被圍

遶身勿令藥氣洩出莫辭衣物具也凡經三五度如此必差

又療骨蒸傳屍方

皂莢長一尺者無相續取炙令微焦去黑皮碎之綿裹

黑錫大如雞子

羊肉大如拳煮

酒貯銅鑊內即著綿裹煎三五沸即瀉去綿裹即內黑錫使融液盡煎取三合令病者先啖肉汁即服

一合如變吐困不須起次以銅盆貯水令病人坐上有蟲麤如馬尾赤色頭黑即效如無以服三合盡

為度一服相去如人行十里必是得驗其禁食一如藥法

並出第二卷中

必效骨蒸病小便方

取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和為兩服中間如人行二十里服

此以後每自小便即取服之仍去前後取中夾者病輕者二十日病重者五十日二十日以後常有蟲

蚰蚘兒且蟲在身當處出俱令去人五步十步聞病人小便臭者無不差台州丹仙觀張道士自服非

常神驗

出第二卷中

灸骨蒸法圖四首

崔氏別錄灸骨蒸方圖并序中書時師崔知辨撰

夫含靈受氣稟之於五常攝生乖理降之以六疾至若岐黃廣記抑有舊經攻灸單行罕取今街巷蒸病

者亦名傳屍亦謂殮殍亦稱伏連亦曰無辜丈夫以瘴氣為根婦人以血氣為本無問少長多染此疾嬰

而德被拂
疑當作佛

孺之流傳注更苦其為狀也髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或臆後近下兩邊有小結多者乃至五六
或夜臥盜汗夢與鬼交通雖目視分明而四肢無力或上氣食少漸就沈羸縱延時日終於溘盡余昔忝
洛州司馬常三十日灸活一十三人前後差者數過二百至如狸頭攪肝徒聞曩說金牙銅鼻罕見其能
未若此方扶危拯急非止單攻骨蒸又別療氣癰風或瘰或勞或邪或癖患伏既廣救愈亦多不可具錄
略陳梗概又恐傳授謬訛以誤將來今故具圖形狀庶令覽者易悉使所在流布頗用家藏未暇外請名
醫傍求上藥還魂返魄何難之有通斯疾者可不務乎

灸骨蒸及邪但夢與鬼神交通無不差之法 使患人平身正立取一細繩令於脚下緊踏男女左右其繩前

頭使與大姆指端齊後頭令當腳根後即引向上至曲腦中大橫文便截繩使斷又使患人解髮分兩邊
使見分頭路仍平身正坐乃取向所截繩一頭與鼻端齊引向上路頭通過逐脊骨引繩向下盡繩頭即
點著又別取小繩一頭與唇端齊合口處一頭向上至鼻底便截斷將此短小繩於前所點處中摺橫分
兩邊兩頭各點記使與中央初點處正橫相當此小繩兩頭是灸處當脊初點者非灸處只借為度其點
拭却

又法 使患人平身正坐稍縮膊取一繩繞其項向前雙垂其鳩尾齊即截斷鳩尾是心岐骨人有無心
岐骨者可從胸前兩岐骨下量取一寸即當鳩尾仍一倍翻繩向後取中屈處恰當喉骨其繩兩頭還雙
垂當脊骨向下盡繩頭點著又別取一小繩令病人合口橫度兩吻便割斷還於脊上所點處橫分點如
前其小繩兩頭是灸處長繩頭非灸處拭却以前摠通灸四處日別各灸七壯以上二七以下其四處並
須滿二十壯未覺效可至百壯乃停候瘡欲差又取度兩吻小繩子當前雙垂繩頭所點處逐脊骨上下
中分點兩頭如橫點法謂之四花此後點兩頭亦各灸百壯此灸法欲得取離日量度度訖即下火唯須
三月三日父為佳療差百日以來不用雜食灸後一月許日患者若未好差便須報灸一如前法當即永

下 右六味切以水七升煮取二升八合去滓分作三服又用牛黃犀角剉碎砂麝香各一細研分為三分每服以一分內湯中服經用多效特忌猪肉粘食生冷莧菜海藻松菜蘇遊同出第三卷中一方有黃芩二兩必效療瘕瘕氣壯熱兼效久為骨蒸驗方 柴胡四兩 茯苓 白朮 枳實各三兩 右四味切以水七升煮取二升半分為三服積熱不歇即加芒硝六分取利熱除之後每三日服一劑差後每月一劑肥白終身永除忌桃李雀肉大醋出第二卷中

虛損慘頰作骨蒸方四首

張文仲療虛損慘頰不食四體勞強時翕翕熱無氣力作骨蒸候方 童子小便一大升淡豉一各切 杏仁四十枚去尖皮碎 右四味合煎取三分中分之二服使盡日別一劑服之至十劑愈若服經三四劑

覺四體益熱即服後方

又方 小便一大升淡豉一各切 豉抄一 生薑一大兩切 生地黃一握 右五味合煎六七沸絞取汁半升許分為兩服或三服每服空腹服至二七日必差差後停三四日將息更服二七日神驗每服五六劑覺內少冷即服前方二方以意斟酌間服常夜合浸頃久便即煎服至五更半令服了至欲明更服後丸服訖至日出時不妨食至晚間未食更一服忌蕪羹

又方 人頭骨三大兩炙麝香一十兩 右二味搗篩和蜜搗一千杵丸如梧子一服七丸日再服以粥飲送藥

若胸前有青脈出者以針刺看血色未變黑者服藥七日必差每日午時能更服後丸一服亦好藥既無毒於事不妨

蘇遊療骨蒸肺痿煩躁不能食蘆根飲子方 蘆根切乾 麥門冬去心 地骨白皮 生薑合皮切 橘皮 茯苓各五兩 右六味切以水二斗煮取八升絞去滓分溫五服服別相去八九里晝三服夜二服覆取汗

忌酢物未好差更作若兼服其人或胸中寒或直惡寒及虛脹并痛者加吳茱萸八兩

瘦病方五首

尚德按
吐
疑當作
病

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有顏色去蟲而牢齒也玉泉口中唾也朝未起早漱口吞之輒琢齒二七過如此者三乃止名曰練精又云咽之三過乃止補養虛勞令人強壯

出第三卷中

廣濟療瘦病每日西即亦色脚手酸疼口乾壯熱攪肝丸方 攪肝丸六分 天靈蓋燒 生犀角屑 前胡升

麻各四 松脂五 枳實分 甘草五分 右八味搗篩蜜和丸如梧子空腹以小便浸豉汁下二十九日

再不利忌海藻松菜生葱麵炙肉魚蒜粘食陳臭等物

又療瘦病方 天靈蓋一大 麝香一兩 桃仁一兩 去皮抄 硃砂一兩 好豉一大 升升 右五味各別搗篩訖然後

搗和令調每晨空腹以小便半升和散方寸匕一服差止不利忌生血物

又療腹脹瘦病不下食方 柴胡 茯苓各十分 枳實五分 白朮 人參 麥門冬去心 生薑各六分 右七味

切以水六升煮取一升八合絞去滓分溫三服服別相去七八里喫一服不利忌生冷油膩小豆粘食

桃李醋物雀肉等

又知母丸主瘦病及久瘡黃等方 知母 常山各三兩 甘草炙 大黃 麻黃去節 黃芩 杏仁各二兩 蜀

漆洗 牡蠣各一兩 右九味搗篩蜜和丸如梧子空心服飲下七丸忌猪肉及葱酒麵服後心悶即吐是

此病出候不唾更漸加兩丸日與諸人服神驗非一忌海藻松菜生葱生菜等此方云是張文仲去英公處傳

救急瘦瘵疾方 甘草三兩 右每旦以小便煮甘草三數沸頻服甚良忌海藻松菜並第二卷中

傳屍方四首

蘇遊論曰大都男女傳屍之候心胸滿悶背膊煩疼兩目精明四肢無力雖知欲臥睡常不著脊脅急痛

膝脛酸疼多臥少起狀如佯病每至旦起即精神尚好欲似無病從日午以後即四體微熱面好顏色喜

見人過常懷忿怒纔不稱意即欲嗔恚行立脚弱夜臥盜汗夢與鬼交通或見先亡或多驚悸有時氣急

尚德按咽
疑當作咽

尚德按膜
疑當作膜
音莫目不
明也

有時欬嗽雖思想飲食而不能多食死在須臾而精神尚好或兩肋虛脹或時微利鼻乾口燥常多粘唾
有時唇赤有時欲睡漸就沈羸猶如水涸不覺其死矣

又論曰傳屍之疾本起於無端草間老少男女皆有斯疾大都此病相尅而生先內傳毒氣周徧五藏漸
就羸瘦以至於死死訖復易家親一人故曰傳屍亦名轉注以其初得半臥半起號為殭殭氣急效者名
曰肺痿骨髓中熱稱為骨蒸內傳五藏名之伏連不解瘵者乃至滅門假如男子因虛損得之名為勞極
吳楚云淋瀝巴蜀云極勞其源先從腎起初受之氣兩脛酸疼腰脊拘急行立脚弱食飲減少兩耳颼颼
欲似風聲夜臥夢洩陰汗痿弱腎既受已次傳於心心初受氣夜臥心驚或多忪悸心懸乏氣呼吸欲盡
夢見先亡有時盜汗食無滋味口內生瘡心常煩熱唯欲眠臥朝輕夕重兩頰口唇悉紅赤如傳脂又
時手足五心皆熱心既受已次傳於肺肺初受氣時時欬嗽氣力微弱有時喘氣臥即更甚鼻口乾燥不
聞香臭假令得聞唯覺朽腐物氣有時惡心憤憤欲吐肌膚枯燥或時刺痛或似蟲行乾皮細起狀若數
片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目膜膜面無血色常欲顰眉視不及遠目常乾澀又時赤痛或復睛
黃朝暮瞢瞢音莫紅切瞢常欲合眼及至於臥睡還不著肝既受已次傳於脾脾初受氣兩肋虛脹食不消
化又時渴利熟食生出有時肚痛腹脹雷鳴唇口焦乾或生瘡腫毛髮乾聳無有光潤或復上氣擗肩喘
息利赤黑汁至此候者將死之證也

又論曰毒氣傳五藏候終不越此例但好候之百不失一

又論曰凡患癰瘕之人多成骨蒸不者即作水病仍須依癰法灸之兼服下水藥差

又論曰此病若脊膂肉消及兩臂飽肉消盡胸前骨出入即難療也若痢赤黑汁兼上氣擗肩喘息皆為
欲死之證也此是藏壞故爾

又論曰童女年未至十三以上月經未通與之交接其女日就消瘦面色痿黃不悟之者將為骨蒸因錯
療之屢有死者有此輩者慎勿療之待月事通自當差矣

又論曰或有人偶得一方云療骨蒸不解尋究根本遂即輕用之主療既不相當病愈未知何日了不求諸鑒者唯知獨任己功若此之人寓目皆是至如以主肺痿骨蒸方將療症癖傳尸者斯乃更增其病豈有得痊之理何者主肺痿方中多是冷藥冷藥非症癖之所宜若用以療症癖此乃欲益反損非直病仍未差兼復更損其脾脾唯宜溫不合取冷如其傷冷脾氣即衰脾衰之證兩肋虛滿食既不消兼之下利如斯穿鑿欲益反損終莫能悟良可悲哉夫略舉一隅他皆倣此

又論曰凡患骨蒸之人坐臥居處不宜傷冷亦不得過熱冷甚則藥氣難通兼之脹滿食不消化或復氣上熱甚則血脈擁塞頭眩目疼唇乾口燥心煩悶渴欲飲水此等並是將息過度之狀深可誡也將養之法須寒溫得所先熱而脫先寒而著若背傷冷即令欬嗽若手足傷熱即令心煩若覆衣傷厚即眠臥盜汗若覆衣過薄即心腹脹滿所是食飲不限時節宜可少食得無數數進之助藥必須傷軟易消也不宜傷硬恐損胃氣此皆以意消息之為佳

又論曰主療之法先須究其根本考其患狀診其三部決其輕重量其可不與其湯藥指期取差若能如此方可措手先療其根次其末針灸湯散必須相應無容病根深遠少服即望痊除未及得瘳便復罷藥乃言藥病乖越似不相當如此懷疑余所不取亦有因瘳後作亦有因痢後為此病根其源非一略舉綱紀比類而取療之方法如後所言

又論曰骨蒸之病無問男女特忌房室舉動勞作尤所不宜陳臭酸鹹粘食不消牛馬驢羊大小二豆猪魚油膩酒麵瓜菓野猪之屬葵葷蒜蔥及生冷等並不得餐自非平復一月以後乃漸開也大略如此觸類而長之此病宜食煮飯鹽豉豆醬燒薑葱韭枸杞首蓿苦菜地黃牛膝葉並須煮爛食之候病稍退恐肌膚虛弱者可時食乾鹿脯為味中間所有得食之者按其條下具言之

廣濟療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食無顏色狀如傳尸病方張文雞末 大麥蘖末

各二生地黄肥大者切三升白朮八升牛膝切桑耳金匱各三升薑黃兩當歸十四生薑合皮桃仁 杏仁去皮尖及雙仁

尚德按冷
疑當作令

者熱各二升 近用加橘皮而八 右十二味並細切於白中以木杵搗之如泥內瓶中以物蓋口封之勿令洩

氣蒸於一大石米中飯熟出之停屋下三日間出暴乾搗為散酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半

不利初服十日內忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百無所忌任意恣口食之唯忌桃李若須

桃李宜去水若不能散蜜丸服之亦得一服三十丸日二服去病令人能食肥健好顏色忌桃李雀肉

燕美山第四卷中

文仲論傳屍病亦名痲瘰通注骨蒸伏連殭殭此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年三年有能食

不作肌膚或二日五日若微勞即發大都頭額頸骨間尋常微熱翕翕然死復家中更染一人如此乃至

滅門療之方 獼肝一具破 豔甲一具破 野狸頭一具破 紫莞四漢防已半 蜀漆洗 麥門冬心甘草一兩 石

八味搗篩以成鍊煑羊腎脂二分合蜜一分烱冷和丸藥如梧子大服十丸加至十五丸日再以飲下

之其藥合和訖分一分頭邊著一分懸門額上一分繫臂上先服頭邊次服臂上次服門上者大驗忌

海藻松葉夏菜

又灸法 立脚於繫鞋處橫文以手四指於文上量脛骨外通脛當四指中節按之有小穴取一縷麻刮

令薄以此麻緩繫上灸令麻縷斷男左女右患多減

又方 青羚羊肺一具破 苒宓子一具破 醋各一 同漬經三日出各於布上暴之令至乾微火熬苒宓

子各搗篩和以蜜丸如梧子服三丸加至四丸

又方地骨皮 白薇 芍藥 甘草 犀角 升麻 茯神 麥門冬 黃芩 桔梗 枳實 大黃

前胡 茯苓 天門冬 生薑 桑根白皮 羚羊角 當歸 柴胡 硃砂 芫薺 鼈甲 蜀漆

知母 石膏 常山 烏梅 香豉 黃耆 地黃 橘皮 以上並可詳度病狀用之並出第

伏連方五首

廣濟療瘦病伏連傳尸鬼氣症忤惡氣方 斑貓去頭射干根各四 石膽七分研 桂心 牛黃各二分 犀角

尚德按十
疑當作十

通按新綜
一作新錄

三分生人參分二石蜥蜴一枚紫石七分蜈蚣四十麝香少許右十一味搗篩為散研相和每日空腹

服一寸匕日三服用井華水二合溫即頓服勿臨喫與白米粥喫好覺小便澀好如含藥勿使婦人小

兒難狗見忌熱麵菓子五辛酒肉生血生葱

又瘰癧病伏連辟諸鬼氣惡症硃砂丸方 光明硃砂一大桃仁十枚去皮尖麝香三分右三味研硃

砂麝香令細末別搗桃仁如脂合和為丸如梧子其和不合以蜜少許合成訖清飲服一七丸日二服

不利忌生血物並出第十卷中

崔氏斷伏連解法 先覓一不開口葫蘆埋入地取上離日開之煮取三匙脂粥內其中又剪紙錢財將

向新塚上使病兒面向還道背塚坐以紙錢及新綜圓塚及病人使面別將少許紙錢圓外與五道將

軍使人一手捉葫蘆一手於坐傍以一刀穿地即以葫蘆坐所穿地及生葫蘆了使一不病人捉兩個

鐮拍病人背咒曰伏連伏連解伏連不解刀鐮解又咒曰生人持地上死鬼持地下生人死鬼即

各異路呪訖令不病人即擲兩鐮於病人後必取二鐮相背不肯更取擲取相背止乃並還勿反顧又

取離日令病人騎城外車轍面向城門以水三升及三重圓病人又作七個不翻餅與五道將軍咒曰

天門開地戶開生人死鬼各異路今五離之日放捨即歸咒訖乃還莫回頭此法大良出第七卷中

文仲療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏連亦名骨蒸傳屍此用此方甚驗 人屎五大升人

小便并新炊粟飲壯大六月六日麴半餅右四味取一瓷瓶盛蜜封置一室中二七日並消一無惡

氣每旦服一大合盡二服無不差者合藥時潔淨燒香勿令婦人小兒女子雞犬孝子見之出第一卷中

延年桃奴湯主伏連鬼氣發即四肢無力日漸黃瘦乍好乍惡不能方 桃奴 苓苓各三鬼箭羽 芍

藥 人參 橘皮各二生薑四檳榔七麝香一分右九味切以水九升煮取二升七合去滓內麝

溫分為三服如行八九里久忌大醋生冷五辛出第十卷中

飛尸方三首

飛尸方三首 近尸方三首

七

病源飛尸者發無由漸忽然而至若飛走之急疾故謂之飛尸其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸
出第二十卷中

集驗療飛尸瓜蒂散方 瓜蒂 赤小豆各一雄黃 右三味擣下細篩一服五分乙稍增至半錢

乙以酪服藥廣濟療中惡心腹絞刺氣急腹中欲絕 廣濟同出七上卷中

備急張仲景療飛尸走馬湯方 巴豆去皮心杏仁各二枚 右二物綿纏搥令極碎投熱湯二合指撿取

白汁便飲之食頃當下老小量服之通療鬼擊病忌野猪肉蘆葦此已見平疰中正療飛尸按不刪也 文仲同出第一卷中

古今錄驗附著散療飛尸在人皮中又名惡脈又名賊風發時急頭痛不在一處鍼灸則移發時一日半

日乃微差須更復發皆療之方 細辛 天雄炮 莽草各一分 桂心三分 附子四分 雄黃二分 烏頭炮 乾薑各四分

分真珠研二分 右九味擣下篩服五分乙不知稍增當以好酒服之忌猪肉冷水生蔥生菜出第六卷中

通尸方三首

病源通尸者言其停通在人肌肉血脉之間若卒有犯觸則發動亦令人心腹脹滿刺痛氣息喘急傍攻

兩脇上衝心胸差後復發停通不消故謂之通尸也出第二十卷中

廣濟療初得通尸及五尸經年不差心腹短氣方 鵲骨三寸炙 羚羊鼻二枚炙 乾薑一兩麝香 右十味擣下細篩一

炙斑貓十四枚去翅足熱 雞屎白三兩 巴豆五枚去心皮熱令黑 芫青二十枚去翅足熱 藜蘆頭熱令黃 右十味擣下細篩一

空腹以飲服如小豆三九日二服稍加至六七九以知為度至吐利忌生冷油膩猪肉蒜粘食陳臭蘆

笋一方無斑雞屎白巴豆芫青藜蘆

又初得通尸鬼症心腹中刺痛不可忍方 青木香 丁香各六分 鬼箭羽 桔梗 紫蘇 橘皮 當歸

各八生薑十二分 檳榔十四分 桃梟十四枚 右十味切以水九升煮取三升絞去滓分為三服日晚再

以快利為度忌如藥法並出第四卷中

集驗療通尸心腹刺痛不可忍方 桂心一尺準 乾薑三分 巴豆二枚去皮心熱 右三味合擣下篩以好苦酒和

之如泥以塗痛處燥即易之忌野猪肉蘆筍千金同用乾薑一兩出第一卷中

五尸方一十一首

肘後療卒中五尸五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸症也其狀皆腹痛脹急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇

或礮塊踊起或攣引腰脊今取一方而兼療之 搗蒺藜子蜜丸如胡豆服二九日三

又方 搗商陸根熬以薑盛之更番熨之冷復易

又方 粳米二升水六升煎二沸服之

又方 掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之並出第一卷中

刪繁療五尸蠱症中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方 丹砂研 乾薑 芎藭 羌活 烏頭炮各四分 芍藥 桂

心各八分 野葛皮三分 吳茱萸合 右九味搗篩蜜和為丸如大豆服三九日三清飲進之忌生血物猪

肉生葱子出第十卷中

備急療卒中五尸遁尸風尸飛尸尸症沈尸其狀皆腹痛脹急衝心攻脇或礮塊踊起或牽腰脊方 破

雞子一枚取白生吞之困者搖頭令下後仲附

又方葛氏 雄黃 大蒜各一兩 右二味搗和取如彈丸內二合熱酒中服之須臾未差更服有尸疹者常

蓄此藥用之驗後仲附 又方 乾薑 附子兩各一 桂心二 巴豆三十枚去 右四味搗篩蜜和又內白中搗萬杵服如小豆二丸

此藥無所不療忌野猪肉蘆筍生葱後仲附 又方 文仲療卒中五尸方 取屋四角茅內銅器中以三尺布覆腹著器布上燒茅令熱隨痛追逐踰下瘳便

差若瓦屋削四角柱燒用之神驗後仲附 古今錄驗八毒赤丸療五尸癰積及惡心痛蠱症鬼氣無所不療即是李子豫亦丸方出胡 雄黃研真

珠研 礬石泥裏燒 牡丹皮 巴豆去皮 附子炮 藜蘆炙各一兩 蜈蚣一校炙 右八味搗篩蜜和丸服如小

尚德按震
疑書作震

豆二九日一極得吐下欲長將服者可減一丸忌猪肉狸肉蘆葦生血等物

又五尸丸療諸尸症方

芍藥 桂心各八分 吳茱萸各一分 丹砂 芎藭 烏頭炮 乾薑各四分 蜀椒目汗去梔

子仁

分五巴豆心皮熱去

右十味搗下篩蜜和丸如大豆一服二九日三忌猪肉生蔥蘆葦生血等物

並出第七卷中胡洽有光花四分野葛皮二分為十二味

尸症方四首

病源尸症者即是五尸內之尸症而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋瀝沈沈默默不知所苦而

無處不惡或腹痛脹滿喘急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或礮塊踊起或攣引腰脊或舉身沉重精神

雜錯常覺昏謬每節氣改變輒致大患積月累年漸就頭滯以至於死死後復易傍人乃至滅門以其尸

病症易傍人故曰尸症

出第二十卷中

刪繁療尸症損鼻或聞哭聲或見尸常發死人席湯方 取死人眠席斬棺內餘棄路者一虎口長三寸

止一物以水三升煮取一升為一服立效

出第十卷中

文仲療尸症方 取新布裏椒薄症上以熨斗火熨椒令出汗立驗

又姚氏方 燒髮灰

杏仁色熟 鈴鱗

右二味搗如脂以猪膏和酒服如梧子三九日三神良

千金同

又鸛骨丸療尸症惡氣兼療百病方

鸛骨炙 桂心各三寸 蝨蟲翅足熟去 巴豆心皮熱去 斑貓翅足熟去

右五味搗篩蜜和為丸如小豆一服二九日三服清飲進之忌野猪肉蘆葦生葱

並出第一卷中

五症方四首

病源注者住也言其連滯停住死又注易傍人也注病之狀或乍寒乍熱或皮膚淫躍或心腹脹刺痛或

支節沈重變狀多端而方云三十六種九十九種及此等五症病皆不顯出其名大體與諸注皆同

出第十卷中

中四卷

刪繁華陀錄狀五症丸療中惡五症五尸入腹胸脇急痛鬼擊客忤停尸垂死者入喉即愈若已禁將物

強發開若不可發扣齒折以灌下藥湯酒隨進之即效方 丹砂研 雄黃研 附子炮各一兩 甘遂半兩 豉六十粒

巴豆六十粒去心 右六味搗下篩巴豆別研令如脂乃更合搗取調白蜜和之藏以蜜器若有急疾

服胡豆二九不覺更益以飲投之此藥多有所療殺鬼解毒破積去水良驗忌生血物猪肉蘆葦錄今

同出第
九卷中

小品五症湯主卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方 大黃三兩別清 甘草二兩 烏頭十枚炮 生薑半斤

桂心兩四 芍藥 當歸各二兩 蜜斤 右八味切以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升投著湯中

去滓分服三合如人行三十里又一服日三不知可至四合王尹威數用之忌海藻菰菜猪肉生葱金十

同出第
四卷中

古今錄驗五症丸一名神仙丸一名千金丸一名轉症丸一名司命丸一名殺鬼丸療萬病邪鬼症忤心

痛上氣厥夢蠱毒傷寒時疾疫癘方 丹砂研 礬石半日 雄黃研 巴豆去心 藜蘆熟 附子二枚各 蜈蚣一枚

足去 右七味搗篩蜜和丸如小豆服一丸日一即差不解夜半更服一丸定止帶一丸辟惡忌猪肉

冷水生血物狸肉出第七卷中

又五野丸療五症尸症哭症冷症寒症熱症在身體寒熱短氣兩脇下痛引背腰脊吸吸少氣不能行飲

食少面目痿黃小便難項強不得俛仰腹堅癰臍左右下雷鳴脹手足煩疼目不明喜忘久風濕痺腰脊

不隨喜夢寤百病皆療之方 牛黃研 麝香研 蜀椒法目 雄黃研 大黃 當歸 蜀烏頭炮 蜀天雄炮 硝

石熱一方用半 人參 桂心 硃砂 細辛 乾薑各二分 石蜥蜴炙 巴豆五十枚去心 鬼白二分 石十

七味搗篩蜜和丸如梧子服三九日再不知稍增以知為度忌猪肉蘆葦生葱生菜生血物出第六卷中

江南九十九症方二首

集驗療江南症病凡有九十九種寒熱尸症此病隨月盛衰人有三百六十脈走入皮中或左或右或裏或表如刀錐所刺乍寒乍熱喉咽如鯁食如噎胸中痛繞臍苦痛食不知味腰中難以俛仰兩膝屈伸面

尚德按汗
目疑當作
目汗

通按本草
無玉支一
作玉泉或
是
尚德按玉
支即羊脂
目作枝者
誤列錄主
治邪氣鬼
症蠱毒王
泉即玉漿
不療邪魅
下同
尚德按沈
千金作就

或黃或青或白或黑至死更相注易方 取桑根白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆二升如此取汁

盡蒸豆熟作羊鹿肉羹噉此豆

卷第一

崔氏金牙散主邪魅心腹刺痛病狀與前方同 金牙研雄黃研丹砂研礬石泥裏燒寒水石 芫青熬

巴豆去皮心朴硝 桔梗 茯苓 人參 貫眾 附子炮蜀椒去汗露蜂房炙龍骨 乾薑 牡桂

烏頭炮石膏研莽草炙從蓉 大戟 芫花熬防風 狸骨炙商陸根 大黃 細辛 蛇蛻炙玉支

一作貝母 一作牙子 即振牙也 右三十二味等分下篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水生菜生血肉大醋蘆葦

集驗同出 第七卷中

江南三十六症方三首

崔氏金牙散療江南三十六症人病經年羸瘦垂死服之皆差并帶之能殺鬼氣逐尸症諸惡屬不祥悉

主之方出胡 金牙研曾青研硝石研礬石泥裏燒石膏研莽草 玉支一作玉泉雄黃研硃砂研寒水石

龍骨 蛇蛻皮炙芫青熬當歸 龍膽 大黃 細辛 防風 大戟 芫花熬野葛炙從蓉 天雄

炮茯苓 附子炮烏喙炮乾薑 人參 桔梗 桂心 椒法目貫眾 巴豆去皮心狸骨炙蜂房炙鵲

晉一各 右三十六味搗篩為散以酒服一錢匕漸增五分匕日三并以三角絳囊貯散方寸匕以繫

頭及心上大良一方加蜈蚣蛇蝎蜥蜴黃鱗鼻麝香毒公合四十二味忌猪肉生血物生菜冷水大醋蘆

戶 出第七 卷中

備急療尸症鬼症者葛氏云即是五尸之中尸症又挾諸鬼邪為害也其病變動乃有三十六種至九十

九種大略令人寒熱沈沈嘿嘿不的知其所苦而無處不惡累年積月漸沈頓滯以至於死後復注易傍

人乃至滅門覺如此候者宜急療之方 攪肝具 右一味陰乾搗末水服一方寸匕日三如一具不差

更作姚氏云神良

又方 桑根白皮灰二升蒸令氣出下以釜湯三四升三遍重淋取二升漬赤小豆二升一宿出風乾復

漬汁盡止乃濕蒸令熟以羊肉或鹿肉作羹進此豆飯食一升漸至二三升重者七八升乃愈病去時體中覺痠癢淫淫或若根本不除重為之

附後同並出第一卷中

症病相染易方三首

深師療鬼物前亡轉相染夢寤紛紜羸瘦往來寒熱嘿嘿煩悶欲寢復不能手足熱不能食或欲向壁悲涕或喜笑無常牛黃散方 牛黃研 鬼箭羽 王不留行 徐長卿一名鬼遠志 附子炮 五味

子 石葦刮去黃皮 黃芩 茯苓各二 桂心一分 代赭三分 菖蒲四分 麥門冬六分 右十五味搗下篩以蜜生地

黃汁相拌合復令相得以酒服方寸匕日三忌猪肉冷水生葱羊肉錫醋物卷中 雄黃研 麥門冬三分

崔氏療江南三十六症丸療轉症滅門絕族族盡轉逐中外滅盡復易親友方 雄黃研 麥門冬三分

天門冬用 皂莢去皮 莽草二分 鬼白三分 巴豆去心 右六味搗篩蜜和為丸如小豆服二九日一服忌

鯉魚野猪肉蘆笋

又赤丸療人久症室家相傳乃至滅族方 雄黃研 馬目毒公也 丹砂研 莽草炙 藜蘆各二 巴豆各十

熱心皮 皂莢去皮 真珠研各一 右八味搗篩蜜和丸如小豆一服二九吐下惡蟲數十枚忌野猪肉蘆笋

生血物並出第七卷中

鬼症方二首

病源注之言住也言其連滯停住也人有先無他病忽被鬼排擊時或心腹刺痛或悶絕倒地如中惡之類其得差之後餘氣不歇停住積久有時發動連滯停住乃至於死死後注易傍人故謂之鬼症也

出第二十卷

古今錄驗神祕丸療鬼症邪忤飛尸症擊犬馬噬蜂蛇毒螫盡皆消除方 大黃四兩 硝石三兩 巴豆去心

雄黃研各二 右四味搗篩蜜和丸如小豆先食服二九日一服忌野猪肉蘆笋卷中

崔氏蜀金牙散療鬼症風邪鬼語尸症或在春晉流無常處不喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張唇

焦爪甲黃方

金牙

一分

蜈蚣

多

蛇

石上

附子

炮各

人參

分四

蜈蚣

七枚

徐長卿

芫青

斑貓

去翅足

雄黃

研一分

桂心

分四

鬼白

分二

野葛

一分

毒公

分三

苦蕒

分石

長生

椒

目

汗

大黃

甘草

房多

會青

代別

研青

真珠

研丹

砂

鬼督郵

烏頭

炮

狼毒

各二

石膏

研五

蘭始

分一

蕪美

鬼箭

鵲骨

炙雷丸

乾漆

龜甲

炙二

各

狼牙

分四

亭長

七枚

母

凝水

石

分五

牛黃

研

胡鷲

尿

鐵精

研一分

硝石

研一分

右四十五

味

搏

篩

為散

先食

酒服

一刀

圭

日再

不知

稍增

之有

蠱

也忌

猪肉

冷水

生葱

海藻

菰菜

生血

物狸肉

出深

師十

金同

也忌

猪肉

冷水

生葱

海藻

菰菜

生血

鬼症

心腹

痛方

一首

古今

錄

驗

還

命

千金

丸

瘰癧

病

心

腹

積

聚

堅

結

胸

背

逆

人方

雄黃

研

鬼白

徐長卿

礬石

泥裏

燒

瓜丁

雌黃

研

乾薑

各四

野葛

分七

斑貓

足

去

目汗

去

地膽

去

射肉

分二

丹參

右十三

味

搏

篩

蜜和

搏

三千

杵

丸

如小

豆

知漸

增

以知

為度

若百

毒所

螫

牛觸

踐

馬所

躡

噉

癰

腫

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

以椒

酒率

家中

大小

各服

一丸

終

歲

無

病

神

良

有

驗

祕

不

傳

出

鬼症

羸瘦

方

二首

古今

錄

驗

黃帝

護

命

千金

丸

瘰癧

病

心

腹

積

聚

堅

結

胸

背

斑貓

足

雄黃

研

雌黃

鬼白

瓜丁

丹砂

研

礬石

泥裏

燒

沙參

莽草

炙

椒

去

目

丸老

小半

之牛

馬所

觸

踐

癰

腫

若毒

所

噉

取

一丸

若

欲

視

病

服

中

大小

各一

丸

一歲

不

病

若

傷

寒

身

熱

服

一丸

若

欲

視

病

又犀

角

丸

療

百

病

鬼

症

惡

風

入

人

皮

膚

注

注

液

流

不得

飲

食

噲

噲

氣

寒

熱

羸

瘦

喜

惡

夢

與

鬼

神

交

通

尚德按肉
疑當作肉
後同

尚德按
毒疑當作
毒疑各字
下疑脫服
字

出第六
卷中

肩牛黃 鬼白

附子地 獺肝美各 巴豆三十枝去 蜈蚣四枚去 麝香 真珠 雄黃研 丹砂研各射

肉分貝 龜十個 血等物並出第

鬼氣方三首

崔氏療鬼氣辟邪惡阿魏藥安息香方 阿魏藥即涅盤經云央匱是也服法旦取棗許大研之為末又

取牛乳一大升煎之五六沸停令熱定取鴨子許大和攪服之更以餘乳盪盪飲之取盡至暮又取安

息香亦如棗許大分如梧子還以熟牛乳服之令盡每日旦暮常然若無乳者即以煮肉汁服之惡久

者不過十日近者不過五日如過三十日不愈便停只得食脯肉之屬但是一切菜不得近口持忌特

忌禮部孫侍即家中有此病所在訪問有人從梁漢來云官人百姓服此得效者十餘家孫侍即即令

依方進服七八日即效便以此法傳授親知得驗者非一余時任度支郎中欲廣其效故錄之卷中

延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方 獺肝分六 人參 沙參 丹參各三 鬼白 苦參各二 石六味搗篩

蜜和丸如梧子大一服十九飲汁下日三服加至十九禁生冷猪魚肉生血等物

又五香丸主天行瘟疫惡氣熱毒心助氣滿脹急及疰鬼氣等方 青木香 犀角屑 升麻 羚羊角屑

黃芩 梔子仁焙 沈香 丁香 薰陸香各四 麝香 鬼白焙 大黃 芒硝各八 石十三味搗

篩蜜和丸如梧子一服三丸飲下日三服加至七丸以差止禁蒜麵猪魚並出第十

鬼魅精魅方八首

病源凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寐喜壓或與鬼神交通

病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能食此魅之所持也出第二

廣濟療傳屍骨蒸瘵肺痿疰鬼氣卒心痛霍亂吐瀉時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉瘵癰丁腫

驚癰鬼忤中人吐乳狐魅吃力迎丸方 吃力迎即白 光明砂研 麝香當門 訶黎勒皮 香附子中 沈香

重青木香 丁子香 安息香 白檀香 畢撥口上 犀角各一兩 薰陸香 蘇合香 龍腦香各半兩

右十五味搗篩極細白蜜煎去沫和為丸每朝取并華水服如梧子四丸於淨器中研破服老小每碎一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裏緋袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時斟量忌生血肉臘月合之有神藏於密器中勿令洩氣出祕之忌生血物桃李雀肉青魚酢等

又療精魅病方 水銀兩一 右取水銀內漿水一升炭火上煎三分減二即去火取水銀如熟豆大取當

日神符裏水銀空腹吞之晚又吞一服日三止無所忌並出第

肘後療卒中邪魅恍惚振噤之方 炙鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾丸半在爪上半在肉上各

七壯不止至十四壯便愈集驗同出

深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此為鬼魅當得殺鬼丸方 丹砂研 雄黃研 龍骨 馬

目毒公 鬼箭兩各五 鬼臼兩二 赤小豆兩三 芫青枚一 桃仁百枚去皮 右丸味搗下篩別研雄黃丹砂細絹

篩合諸藥拌令和調後內蠟和之大如彈丸絳囊盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬

見之所服蜜和丸如梧子一服三丸日三忌五辛生血物出第

小品療鬼魅四物驚頭散方 東海鳶頭根 黃牙石又名 蓂蓉 防葵各一 右藥搗下篩以酒服方

寸匕欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵蓂蓉並令人迷惑恍惚如狂

不可多服備急千金同

集驗療男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休止皆邪氣所為不能自絕丸物牛黃丸方 荆實人精

會青也 龍精 玉屑白虎精 牛黃土精 雄黃地精 空青天精 赤石脂精 雄龍骨水精 各一兩凡九

物名曰九精上通九天下通九地 右搗下篩蜜和丸如小豆先食吞一丸日三稍加以知為度忌羊

血文仲千金并翼

必效辟鬼魅方 虎爪 赤珠 雄黃 蟹爪 右四味搗令碎以松脂融及煖和為丸不然硬正朝旦

及有狐鬼處焚之甚效以熏人即神去王三師云奇效忌生血物

出第四卷中

近效大麝香丸療積年心痛尸疰蠱毒癰瘰氣來心兩肋下有塊溫瘴精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂等所

螫並療之方 麝香 牛黃 藜蘆 硃砂 蜀當歸 茯苓 桔梗 鬼箭羽 金牙 烏頭 桂心

吳茱萸 貫衆 丹參 蜈蚣 乾薑 人參 虎骨 鬼白 芍藥 雄黃 各半 巴豆 心皮 蜥蜴 炙 右二十三味搗篩蜜和丸如梧子以飲下三丸至辰時下利若不利熱飲投之即利

三兩行後冷醋飲止之即定然後煮葱食之勿食冷水明日依前服之永差忌熱麵生菜柿子梨等蛇蠍

蜂螫取一丸研破和醋塗之便差精鬼狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅無早晚每日服

前藥兩丸只三兩日服即差仍每日燒一丸熏身體及衣裳宅中燒之亦好無患人以三五丸緋絹袋

盛繫左肩上辟虎毒蛇諸精鬼魅等忌狸肉食血物豬肉生葱蘆笋

鬼神交通方四首

崔氏療夢與鬼神交通及狐狸精魅等方 野狐鼻 豹鼻 狐頭骨 雄黃 膈臍 鬼箭羽

露蜂房 白朮 虎頭骨 阿魏藥 驢馬狗馳牛等毛 如死人腰骨一兩 右十五味並

大秤兩搗篩為散攪使調勻又先以水煮松脂候烱接取以和散和散之時勿以手攪將虎爪攪和為

丸如彈丸以熏患者欲熏之時蓋覆衣被勿令藥煙洩外別搗雄黃為末以藉藥燒藥即度一如熏香

法其藥欲分於牀下燒熏彌善忌桃李雀肉等

出第七卷中

備急陶氏療女人與鬼物交通獨言笑或悲思恍惚方 松脂 內雄黃末 右二味用虎爪攪令

調丸如彈丸夜內籠中燒之令女裸坐籠上被急自蒙唯出頭耳過三熏即斷

又方 雄黃 人參 防風 五味子 右四味為散早以井華水服方寸匕日三服

又若男女喜夢鬼通致恍惚者方 鹿角屑酒服三撮日三

並出第三卷中

白虎方五首

尚德按廣濟以下六字疑當揭書

尚德按爪疑當作爪焚藤竹杓

近效論白虎病者大都是風寒暑濕之毒因虛所致將攝失理受此風邪經脈結滯血氣不行蓄於骨節

之間或在四肢肉色不變其疾晝靜而夜發發即徹髓酸疼乍歇其病如虎之嗜故名曰白虎之病也廣濟療白虎方犀角屑當歸芍藥各六牛膝沉香青木香虎頭骨各銍麝香一分槲葉服一握

右凡味切以水六升煮取二升六合去滓分溫三服如人行四五里進一服別加麝香末服之不利忌生菜麵蕎麥蒜出第四卷中

蘇孝澄療白虎病云婦人丈夫皆有此病婦人因產犯之丈夫眠臥犯之為犯白虎爾其病口噤手拳氣不出方灸臍中七壯一云灸臍中七壯

近效療白虎方炭灰五升無炭灰亦一過蚯蚓糞一升紅藍花六右三味一處攪和熬令熟取好醃

醋煖之拌令泥泥以故布三四重裏分作四分更番當所患痛處熨之數數轉勿住手按之冷熱得所

甯令小熱不得作冷冷即復熱令熱又熨之並用後咒法曰青儂皮青毛出黃儂皮黃毛出赤儂皮赤

毛出白儂皮白毛出黑儂皮黑毛出急出吾口神吾口聖唾山山崩唾石石裂得汝字汝不出斫頭斫

頭急急如律令其咒法先令人唾痛處以手接之不住手便即誦此咒不限遍數以差即停當誦咒不

得令病人及傍人聞咒須先淨漱口潔淨良效無比千金勿傳又療風毒腫一切惡腫白虎病並差方取三年醞醋五升熱煎三五沸切葱白三二升煮一沸許即入

雞澆出布帛熱裏當病上熨之以差為度又療白虎方猪肉半三大麻子合酒右三味和麻子口含嚙上將猪肉三串手擘向痛處來去咒曰

相州張如意張得咒是汝白虎本師急出咒訖將肉安牀下差送路頭神驗

無辜方二首

崔氏無辜閃癖或頭乾癢癰頭髮黃聾分去或乍痢下差諸狀既多不可備說大黃煎丸方大黃九兩

新實者若微朽即不填用劑去蒼皮乃研右一味擣篩為散以上好米醋三升和之置銅椀內於大鑪中浮湯上炭火煮

尚德按今
有方五首

之火不用猛又以竹木篾攪藥候堪丸乃停於小瓷器中密貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常
以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根
本大人小兒不等以意量之此藥唯下膿及宿結不令兒痢禁牛馬驢雞猪魚兔肉生冷粘滑油膩小
豆蕎麥乳母亦同此忌

又療無辜腦後兩畔有小結者方

無辜之病此結為根欲療者先看結之大小然後取細竹針酌龍得

此結便截竹使斷狀如指環形仍將此竹龍結自然不得轉動以火針針結子中央作兩下去針訖乃
塗少許膏藥無者雜油亦得須待三兩日又如前報針更經一兩日當膿水自出若不出復如前針候
膿潰盡結便自散俗法多用刀子頭割者謂之割無辜此來參詳殊不如針之以絕根本恐患者不悉
故復重說之

並出第七卷中

除骨熱方四首

范汪療骨熱狸骨丸方

狸骨

連翹

各五

土瓜

山茱萸

元參

胡鷄屎

黃芩

丹砂

馬目毒

公

鷲尾

各二

黃連

芍藥

雄黃

青箱子

龍膽

枯薑

各三

右十六味

搗篩蜜和丸如梧子

先食服三丸日三不知稍稍增之以知為度禁食生魚菜猪肉黃黍米生血物古今錄

古今錄驗除熱三黃丸療骨蒸熱身多瘡癰癰腫者方

大黃

黃芩

黃連

當歸

茯苓

桂心

乾薑

芍藥

各二

梔子

各一

柴胡

各三

右十味

搗篩蜜和丸先食服如小豆三丸不知增至十丸欲

取微利以意增之久服益良忌生葱醋物猪肉冷水

又方

大黃

黃連

黃芩

各一

芒硝

各二

右四味

搗篩蜜和為丸一服五丸漸加以知為度忌猪肉冷

水

並出第四卷中

盜汗方七首

病源盜汗者因眠睡而身體流汗也此由陽虛所致久不已令人羸瘠枯瘦心氣不足亡津液故也診其

尚德按李時珍本草麻黃根附方治小兒盜汗引之無仍又以作仍字以

脈男子平人脈虛弱細微皆為盜汗脈也出第三卷中

崔氏療盜汗夜睡中即汗汗不休必得風方麻黃根切小麥各二右二味以水一斗二升煮小麥得

九升內麻黃根煮之得三升去滓分為三服常夜服之不過兩劑即止

又方 甘草 薑各一兩杏仁三兩去尖皮熟當歸右四味擣合蜜和丸服如梧子五丸漸漸增之

又方 取死人席緣燒作灰淋汁熱洗從頭至足愈

又止汗粉方送規麻黃根 牡蠣粉 敗扇灰 枯蔓各三兩白朮二兩米粉三升右六味擣諸藥下篩為

散和粉攪令調以生絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍炙大椎五六百炷日灸二七五七任

意不能日別灸亦得汗即漸止並出第三卷中

延年主盜汗夜臥床席衣被並濕方 麻黃根 牡蠣碎之綿裹各三兩黃耆 人參各二兩枸杞根白皮 龍骨

打碎各四兩大棗七枚右七味切以水六升煮取二升五合去滓分溫六服如人行八九里久中間任食


一日令盡禁蒜麵等物

又療夜臥盜汗方 左顧牡蠣 黃耆各三兩麻黃根五兩杜仲二兩右四味擣篩為散一服方寸匕日三夜

一服用敗蒲扇煮取汁下藥禁蒜麵並出第三卷中

古今錄驗療盜汗麻黃散方 麻黃根分三故扇一分右二味擣下篩以乳服三分仍日三大人方寸匕

日三不知益之又以乾薑三分粉三分擣合以粉粉之大善出第十卷中



W 2467 w

1915

V. 11-13